

34—36,80	Ghiaietta con argilla.
36,80—37,60	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
37,60—45,40	Ghiaietta con argilla.
45,40—62	Argilla.
62—64	Ghiaia con argilla.
64—65	Sabbia cementata.
65—75	Argilla.
75—76	Sabbia argillosa.
76—78,50	Argilla compatta.
78,50—83	Sabbia scura fine.
83—90	Sabbia fine argillosa.
90—97	Argilla giallastra e verdastra compatta.
97—101	Argilla verdastra.

Il livello statico dell'acqua in questo pozzo è a metri 1,50 sotto il suolo; la portata idrica, col pompaggio, è di 20 litri al 1".

Per queste regioni veggasi anche il Vol. I (1912), dove si tratta di **Cumiana** (pag. 30); **Stupinigi** (pag. 35); **Sangano** (pag. 36); **Grugliasco** (pag. 38); **Collegno** (pag. 38) nonchè il Vol. II (1924) a pag. 17; **Rivalta** (pag. 38); **Pianezza** (pag. 39).

Nella regione **Bivio di Cumiana** alla C.^a Boria dell'Avv. G. Racca, la Ditta «L'Artesiana» perforò recentemente un pozzo che mostrò la seguente serie di terreni, di cui il Museo geologico del Politecnico di Torino possiede vari campioni (N.º d'Inv. 39.269):

- 0—4 Terreno agrario, poi alluvionale giallo-rossastro.
- 4—19 Ghiaia spesso fortemente cementata.
- 19— Sabbia che diventa, in complesso, sempre più fine verso il basso; *falda acquifera abbondante che sale a 4 m. sotto il suolo.*

Alle *Cascine Nuove* di **Cumiana** un pozzo trivellato, verso il 1928, secondo i quattro campioni conservati nel Museo geologico del Politecnico di Torino, al N.º 39.204 d'Inv., indica i seguenti terreni:

- a m. —19 Argilla sabbiosa compatta, grigio-giallastra.
- 22—23 Argilla sabbiosa compatta, giallognola.
- a m. —24 Argilla sabbiosa compatta, giallognola.
- a m. —25 Argilla sabbiosa compatta, grigia.

La formazione può riferirsi probabilmente al Plistocene.