

- 39—51 Ghiaia leggermente argillosa.
51—52 Argilla giallastra sabbiosa.
52—53,50 Sabbia arenacea argillosa.
53,50—61 Argilla sabbiosa con molta ghiaia.

Il livello statico dell'acqua rimase a metri 25,40, ed il livello dinamico a metri 29,50 sotto il suolo; la portata, col pompaggio, è però di 57 litri al 1".

A **Torino** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1928, per conto della S.I.P. (*Corso Mortara*, 66 ang. via Intra) una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—3,50 (Avampozzo).
3,50—11,40 Conglomerato e grossi ciottoli.
11,40—13,90 Sabbia, ghiaia e ciottoli; 1^a zona acquifera.
13,90—18 Ciottoli e ghiaia.
18—22,50 Sabbia con ghiaietta; 2^a zona acquifera.
22,50—23,50 Argilla.
23,50—33,50 Sabbia argillosa giallastra, compatta.
33,50—36,50 Sabbia e ghiaia un po' agglomerata; 3^a zona acquifera ma poco abbondante.
36,50—38,50 Argilla grigiastria, compatta.

In questo pozzo l'acqua si livella a metri 8,30 sotto il suolo ed ha, col pompaggio, una portata di 45 litri al 1".

La base della serie potrebbe già essere di Terziario marino; il Museo geologico del Politecnico di Torino possiede alcuni campioni di questa serie (N.º d'Inv. 36.840).

A **Torino** (via Cibrario; regione Martinetto), per conto dell'Azienda Municipale, la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1928, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—12 Argilla gialla con ciottoli e ghiaia.
12—16 Ciottoli.
16—18,50 Ghiaia, acquifera.
18,50—28 Argilla gialla.
28—28,50 Ghiaia, acquifera.
28,50—32 Argilla giallastra.
32—62 Argilla cinerea sabbiosa e Conchiglie.

Il livello statico di questo pozzo è a — 10 metri; la portata idrica è, col pompaggio, di 25 litri al 1".

Anche questa trivellazione raggiunse il *Piacenziano* fossilifero come si verificò in altri punti di Torino (Vedi: F. Sacco, l. c.).