

La poca acqua trovata in questo pozzo vi si livella a —28 m.
Sgraziatamente non potei avere i campioni conchigliiferi per vedere se trattasi di deposito lacustre o di Pliocene marino.

Nella località di *Monasterolo Vaprio d'Adda*, nel Comune di **Casano d'Adda** (Bergamo), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1923, una seconda trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

6—7	Ghiaia sabbiosa.
7—10	Sabbia pura, sciolta.
10—12,50	Sabbia con poca ghiaia.
12,50—19,50	Sabbia.
19,50—47	Sabbia con ghiaia.
47—49	Argilla.
49—81	Conglomerato.
81—83	Argilla.
83—86	Arenaria compatta.
86—93	Argilla bleuastrea.
93—108	Arenaria friabile.
108—112	Sabbia bruna, finissima.
112—115	Argilla compatta, giallastra.
115—120	Sabbia e ghiaia.
120—122	Arenaria friabile.
122—144	Arenaria compatta.
144—154	Strati alternati di arenaria friabile e piccolissimi strati di argilla; <i>zona acquifera.</i>

L'acqua, scarsa, di questo pozzo si livella a —5 m.

A **Scanzo** (Bergamo), nel 1929, la Soc. An. «Alfa Romeo» per ricerca d'acqua effettuò un sondaggio che attraversò la seguente serie complessiva di terreni:

0—69	Terreno conglomeratico, qua e là argilloso - impuro.
69—143	Terreno argilloso con ciottoli.
143—153,75	Terreno ghiaioso; <i>falda acquifera.</i>

Nello *Stabilimento Chimico* di **Seriate** (Bergamo), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1927, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—9	Argilla.
9—10	Terreno durissimo.
10—14	Conglomerato di ghiaia (ceppo).
14—39	Conglomerato durissimo.