

83—89	Argilla.
89—91,60	Argilla sabbiosa.
91,60—210,20	Sabbie ecc. con fossili del <i>Pliocene</i> .
210,20—	Terreno miopliocenico, mineralizzato, con <i>acqua salata</i> ed Idrocarb.

Il sondaggio fu spinto a — 280 m.

A **Fontevivo** la sonda n. 7 (50 m. s. l. m.) dell'A.G.I.P., attraversò la seguente serie:

0—5	Argilla giallastra.
5—12	Ghiaia.
12—16	Argilla.
16—37	Ghiaia.
37—41	Sabbia e ghiaia.
41—50	Ghiaia.
50—53	Argilla sabbiosa.
53—57	Ghiaia.
57—61,50	Argilla
61,50—64,50	Ghiaia.
64,50—70	Sabbia grossolana con ciottoli.
70—78	Sabbia argillosa.
78—87,20	Ghiaia.
87,20—96,50	Argilla sabbiosa.
96,50—109	Argilla sabbiosa con fossili del <i>Pliocene</i> .
109—175	Terreno vario pliocenico.
179—	Terreno miopliocenico.

Il sondaggio fu spinto sino a — 311 m.

L'A.G.I.P. trivellò, a Fontevivo, altri pozzi, una dozzina circa, ma è inutile riportare tali serie, più o meno analoghe alle sopracitate.

A **Collecchio** (S. O. di Parma) la trivellazione eseguita nel 1929 dalla Ditta Bonariva, a conto del Prof. Gallenga, attraversò la seguente serie, che è probabilmente, sotto l'alluvione, in gran parte pliocenica; ma senza campioni non si può giudicare.

0—1	Terreno vegetale e rimaneggiato.
1—31	Alluvione ciottolosa fra sabbie argillose. 1 ^a falda <i>acqua</i> .
31—32	Conglomeratò.
32—37	Argilla con ciottoli.
37—42	Argilla giallastra, compatta.
42—44	Argilla grigio-verdiccia sabbiosa.
44—53	Formazione giallastra durissima.
53—55	Formazione arenacea.
55—58	Argilla brunastra.