

A mezza strada *Mondovì-Fossano*, nel Comune di **Trinità** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1928, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—0,60	Argilla scura.
0,60—8,60	Ghiaia, sabbia e ciottoli; <i>zona acquifera</i> .
8,60—19	Argilla giallastra.
19—25	Argilla giallastra, con ciottoli.
25—30,60	Argilla giallastra.
30,60—34,50	Ghiaia e argilla.
34,50—36,50	Ghiaia <i>acquifera</i> .
36,50—37	Argilla biancastra.

Il livello statico dell'acqua in questo pozzo è a m. 0,50 sotto il suolo; il suo rendimento, col pompaggio, è di circa 60 litri al 1".

Per **Boves** Vedi: Vol. I (1912), pag. 17.

Per **Cuneo** Vedi: Vol. I (1912), pag. 7.

Alla **Trinità** la Ditta Massarenti perforò un altro pozzo che, sotto poco deposito quaternario, attraversò la seguente serie appartenente al Pliocene superiore:

0—0,60	Terriccio argilloso brunastro.
0,60—8,50	Alluvione sabbioso-ghiaioso-ciottoloso.
8,50—19	Zona argillosa giallastra.
19—25	Ghiaia fra terreno argilloso giallastro.
25—30,50	Zona argillosa giallastra.
30,50—34,50	Ghiaia mista con argilla giallastra.
34,50—36,50	Ghiaia.
36,50—40	Zona argillosa biancastra.

Il risultato idrico fu scarso; neppure una ventina di litri al 1" con intenso pompaggio.

Nella parte alta della **Trinità** il Comune fece eseguire recentemente dal Geom. Ruffino, una trivellazione che attraversò la seguente serie:

0—3	Terreno rimaneggiato.
3—19	Terreno ghiaioso-argilloso giallo-rossigno, <i>colla solita acqua freatica</i> .
19—27	Marne sabbiose giallastre.
27—37	Conglomerato compatto.
37—44	Marna sabbiosa giallastra.
44—47	Conglomerato di sabbie e ghiaie cementate.