

Per la stessa località *Molinone* (forse dello stesso pozzo?), ebbi altri dati, alquanto diversi, che pure riporto:

0—1,50	Terreno di riporto.
1,50—13	Argilla compatta, rossastra.
13—15	Sabbia e ghiaia.
15—18	Sabbia.
18—49	Argilla compatta con trovanti di arenaria.
49—56	Marna verdastra con tracce di arenaria.
56—63	Marna bleuastra con strati di arenaria.
63—70	Roccia bruna, compatta (?).
70—71,90	Ghiaia con sabbia bruna.
71,90—100	Arenaria.
100—112	Strati di sabbia e calcarei con argilla compatta.
112—145,50	Piccoli strati di arenaria con argilla compatta.

Buona parte di detta serie appartiene al Miopliocene e quindi naturalmente senza l'acqua desiderata.

A *Genestrello* di **Montebello** (Prov. di Pavia) un pozzo trivelato dalla Soc. An. «Alfa Romeo» nel 1929, per conto dell'Avv. Barone Lanzone De Ghislanzzone, incontrò la seguente serie stratigrafica:

0—23	Terreno argilloso.
23—35	Terreno ghiaioso con sabbia argillosa.
35—67,50	Terreno argilloso.
67,50—69,40	Sabbia fine.
69,40—84	Terreno argilloso.
84—85,50	Terreno ghiaioso-sabbioso-ciottoloso.
85,50—114,60	Terreno argilloso.

Lo scopo era la *ricerca d'acqua*, ma ebbe *esito negativo*.

Invece un pozzo perforato a **Montebello** pure nel 1929, dalla stessa Società e per lo stesso Barone Lanzone, dopo aver attraversato 37 m. di terreno sabbioso-ghiaioso, pure per *ricerca d'acqua*, ebbe *esito ottimo*.

Alla Stazione ferroviaria di **Piacenza**, la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1926, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—4	(Avampozzo).
4—12	Ghiaia.
12—31	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .
31—46	Ghiaia con argilla.