

In questo pozzo l'acqua si livella a m. 6,20 sotto il suolo ed ha, col pompaggio, una portata di 90 litri al 1".

Nella C.^a Podgora del sig. Giov. Oderda, in fraz. di Casanova, la Soc. An. Massarenti trivellò, nel 1930, un pozzo di 64 m., fra terreno argilloso-sabbioso-ghiaioso giallastro, talora argilloso-sabbioso grigio, qua e là un po' torboso, ma non ne ebbi campioni in esame.

In questa serie fluvio-lacustre, che dal *Plistocene* passa in basso al *Villafranchiano*, furono riscontrate *tre falde acquifere*, cioè: una prima fra i 15 ed i 20 metri, una seconda fra i 30 ed i 38 metri, ed una terza fra i 50 ed i 55 metri di profondità; il livello piezometrico di quest'acqua rimase verso i 12 metri sotto il piano di campagna. Però sonvi al riguardo molte variazioni, come risulta dall'esame dei singoli pozzi, nonchè dalle indicazioni sintetiche indicate a pag. 32

Per la Tenuta **Casanova** Vedi anche: Vol. I (1912), pagg. 14-18, e Vol. II (1924) pagg. 6-7.

Alla C.^a Verona (Comune di **Ceresole** d'Alba) del Dott. G. Daneo, la Ditta Bonariva trivellò, nel 1929-30, un pozzo, di cui il Museo geologico del Politecnico di Torino conserva 22 campioni (al N.º 39.211 d'Inv.), da — 71 metri in giù. La serie stratigrafica è la seguente:

0—5	Terreno agrario e rimaneggiato.
5—32	Sabbia e ghiaia con intercalazioni argillose; verso la base vi è un po' d'acqua (freatica) non saliente e che d'estate quasi scompare. (Avampozzo mur.).
32—37	Sabbie e ghiaie poco acquifere.
37—54	Argilla sabbiosa.
54—55	Argilla compatta.
55—57	Terreno argilloso-sabbioso con interstrati ghiaioso-ciottolosi (anche ad elementi pugilari o cefalari), con poca acqua, saliente a —27 metri.
57—60	Argilla sabbiosa.
60—61,56	Argilla compatta.
61,50—62,50	Sabbia, acquifera.
62,50—63,50	Argilla compatta.
63,50—65	Sabbia, acquifera.
65—67	Argilla sabbiosa.
67—68	Argilla.
68—69	Sabbia, acquifera.
69—71	Argilla compatta.