

12,50—16	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
16—33	Argilla sabbiosa biancastra.
33—34,70	Ghiaia.
34,70—49	Argilla sabbiosa biancastra.
49—72	Argilla cinerea con Conchiglie.
72—74,20	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
74,20—79	Argilla cinerea.

La parte inferiore della trivellazione entrò nella serie pliocenica.

Il livello statico dell'acqua è a —10 m.; la portata idrica, col pompaggio, è di 29 litri al 1".

Per **Castelnuovo Rangone** Vedi anche Vol. I (1912), pag. 144.

A **Formigine** (S.E. di Modena) per il Col.^o G. Lucchi, la Ditta Bonariva trivellò, nel 1926, un pozzo che attraversò la seguente serie di terreni:

0—1	Terreno agrario rimaneggiato.
1—14	Alluvione ghiaiosa.
14—15	Argilla con ghiaia; <i>zona acquifera</i> .
15—34	Alluvione ghiaiosa.
34—80	Alluvione sabbioso-ghiaiosa con blocchi sparsi. <i>Zona acquifera</i> .
80—88	Sabbia fine alternata con tufo (marna?).
88—95	Sabbia e ghiaia.

Questo pozzo diede dapprima *una discreta quantità d'acqua*, poi, per insabbiamento del tubo, venne abbandonato. Non ebbi in esame i campioni; l'indicazione di *tufo* potrebbe già accennare al Pliocene.

A **Formigine** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

4,80—6	Argilla giallastra.
6—11	Ghiaia.
11—24	Argilla giallastra e ciottoli.
24—26	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
26—30	Argilla grigia.
30—36	Argilla bleuastra.
36—38	Ghiaia.
38—47	Argilla grigia.
47—48,50	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
48,50—56	Argilla bleuastra.
56—58	Argilla grigia.
58—59	Argilla sabbiosa.
59—63	Argilla cinerea.
63—65	Argilla cinerea sabbiosa.