

Nel Comune di **Lagnasco** (Cuneo), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1928, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—5,50	(Avampozzo).	
5,50—15	Ciottoli molto grossi.	
15—19,50	Ghiaietta e sabbia con ciottoli.	} <i>Zona acquifera</i>
19,50—25	Ghiaia e sabbia e ciottoli.	
25—28	Argilla.	
28—37	Argilla e ghiaia.	

L'acqua si livella in questo pozzo a metri 5,30 sotto il suolo ed ha la portata, col pompaggio, di 50 litri al 1".

Nella località *Cerretto* del Comune di **Costigliole Saluzzo** per conto del sig. Rizzi Achille, la Soc. An. Massarenti trivellò, nel 1933, un pozzo che attraversò la seguente serie di terreni:

0—19	(Avampozzo).
19—28	Argilla rossiccia con ghiaietta.
28—42	Piccoli strati di argilla bianco-grigia e qualche ciottolo.
42—43	Argilla giallastra, dura.

Non si hanno dati idrologici.

A **Saluzzo** presso il piazzale della stazione ferroviaria, fu trivellato, verso il 1926, un pozzo, di cui si conservano 14 campioni nel Museo geologico del Politecnico di Torino (N.º d'Inv. 36.825) i quali indicano la seguente serie:

0—34	Alluvione sabbioso-ghiaiosa.
34—41	Sabbia terrosa ghiaiosa, bruno-gialliccia.
41—45	Sabbia terrosa, ghiaioso-ciottolosa, bruno-gialliccia.
45—50,10	Sabbia grossolana, giallo-rossiccia.
50,10—55	Sabbia, ghiaia e ciottoli.
55—58,20	Zona prevalentemente ghiaioso-ciottolosa, giallastra.
58,20—61,90	Sabbia grossolana, un po' ghiaiosa, giallastra.
61,90—67,70	Sabbia grossolana di tinta rosso-mattone.
67,70—70	Sabbia grossolana di tinta giallo-rossiccia.
70—72	Sabbia e ghiaia grigio-giallastra.
72—78	Sabbia grossolana giallo-rossiccia.
78—82	Sabbia e ghiaia grigio-giallastra.
82—86	Sabbia grossolana passante a ghiaietta, giallo-rossastra.
86—90	Sabbia grossolana.

Si tratta evidentemente di una formazione alluviale del Quaternario, in buona parte pliocenica; i materiali sabbiosi e ghiaiosi