

60,50—70,50	Argilla bleuastra, compatta.
70,50—75,50	Ghiaia un po' dilavata.
75,50—79,50	Argilla con ciottoli grossi.
79,50—87,50	Ghiaia con ciottoli e sabbia, <i>acquifera</i> .
87,50—89	Argilla giallastra e ciottoli.

Il livello statico di questo pozzo sta a -10 m.; la portata idrica, col pompaggio, è di 60 litri al 1".

Nella località *Magreta*, nel Comune di **Formigine** (Modena), la Soc. An. Massarenti eseguì, ancora nel 1928, un'altra trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

15,50—22	Ghiaia con strati di argilla e ciottoli grossi.
22—25	Ghiaia dilavata con ciottoli grossi.
25—44,50	Argilla giallastra.
44,50—56,50	Ghiaia dilavata, <i>acquifera</i> .
56,50—60	Argilla giallastra.
60—63,20	Ghiaia e ciottoli; <i>zona acquifera</i> .
63,20—68	Ghiaia.
68—73,30	Ghiaia con argilla e ciottoli.
73,30—83	Argilla bleuastra e torba.
83—86,50	Ghiaia dilavata, <i>acquifera</i> .
86,50—89	Argilla cinerea.

L'acqua in questo pozzo livellasi a -11 m., ed ha un rendimento di 45 litri al 1" col pompaggio.

Nella località *Magreta*, nel Comune di **Formigine** (Modena), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, un'altra trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

8,50—18,80	Ghiaia dilavata con ciottoli grossi.
18,80—38,80	Ghiaia e ciottoli con argilla giallastra.
38,80—47,50	Argilla giallastra.
47,50—59	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
59—68,50	Conglomerato di ghiaia.
68,50—77	Argilla giallastra con ghiaia e ciottoli.
77—79,60	Argilla giallastra.
79,60—83	Ghiaia, <i>acquifera</i> .
83—84,50	Argilla bleuastra-scura.
84,50—94	Argilla bleuastra con Conchiglie.

L'acqua in questo pozzo si livella a m. 10,70, ed ha una portata, col pompaggio, di 24 litri al 1".

Queste trivellazioni entrarono colla loro parte inferiore nel Pliocene, ma non ebbi in esame i campioni.