

44—45	Argilla nerastra.
45—52	Ghiaia, <i>con acqua</i> .
52—53,50	Argilla giallastra.
53,50—54	Ghiaia.
54—57	Argilla nerastra.
57—58	Ghiaia.
58—73	Argilla nerastra.
73—77,50	Conglomerato.
77,50—81	Argilla nerastra.
81—85,50	Conglomerato.
85,50—90	Argilla nerastra.
90—96	Conglomerato.
96—98	Ghiaia e sabbia; <i>zona acquifera</i> .
98—102	Conglomerato e ghiaia.

L'acqua di questo pozzo si livella a — 10 m. ed ha un rendimento, col pompaggio, di 80 litri al 1". (Vedi Tav. II, fig. 3).

Nella località *Rizzolo* del Comune di **S. Giorgio Piac.**, la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1933, pei F.lli Zilli, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—88	Pozzo già costruito.
88—111,60	Argilla verdastra con piccoli strati di torba.
111,60—113	Argilla calcarea con qualche ciottolo.
113—129,50	Argilla azzurrognola.
129,50—136,50	Ghiaia, sabbia e strati di conglomerato.
136,50—144	Argilla grigio-cinerea, calcarea, con qualche ciottolo.
144—144,80	Argilla azzurrastra.
144,80—145,30	Ghiaia con Conchiglie.
145,30—148	Argilla azzurrastra, scura.
148—149	Torba.
149—150,50	Argilla azzurrastra.

In questo pozzo l'acqua presenta il suo livello statico a — 4 m.; col pompaggio si ottennero solo 7 litri al 1".

Questa trivellazione pare abbia raggiunto il Pliocene marino.

A *Ronco* di **Cornegliano**, borgata presso **San Giorgio Piac.**, (a circa 15 Km. da Piacenza), il Consorzio della Chiavica fece trivellare, dalla Soc. An. «Alfa Romeo», per ricerca d'acqua, un pozzo che, nel complesso, attraversò i seguenti terreni:

0—10,50	Terreno arenaceo con argilla e ghiaia grossolana.
10,50—80	Terreno argilloso-sabbioso con ciottoli.