

- 13,50—17 Sabbia grossolana, passante a ghiaietta, essenzialmente quarzosa, sciolta.
 17—22 Sabbia e ghiaia, essenzialmente quarzosa, sciolta.
 22—27 Sabbia un po' terrosa, grossolana mista a ghiaia, sciolta, di tinta grigio-giallastra.
 27—35 Sabbia e ghiaia, essenzialmente quarzosa, grigiastra, sciolta.

Le formazioni sabbioso-ghiaiose inferiori sono *assai acquifere tanto da fornire, col pompaggio, anche 25 litri al 1''*.

A **Candiolo** (Torino) la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1928, una trivellazione che attraversò le seguenti serie di terreni:

- 0—7,10 Argilla scura.
 7,10—7,30 Ghiaia.
 7,30—16,50 Argilla scura.
 16,50—17,40 Ghiaia e sabbia, *acquifera*.
 17,40—23,10 Argilla sabbiosa, scura.
 23,10—23,80 Sabbia e ghiaia, *acquifera*.
 23,80—34,70 Argilla scura.
 34,70—35,90 Sabbia e ghiaia, *acquifera*.
 35,90—41 Argilla giallastra.
 41—48 Argilla sabbiosa.
 48—49,50 Argilla giallastra.
 49,50—63,80 Argilla cinerea.
 63,80—64 Sabbia, *acquifera*.
 64—70,50 Argilla grigio-cinerea.
 70,50—75 Sabbia.

A N. O. di **Candiolo** presso C.^a *Ceppea* del sig. Bosio, nel 1929 la Ditta Balzarini di Torino perforò un pozzo che mi fu riferito aver attraversato la seguente serie sedimentaria:

- 0—6 Terreno agrario e alluvionale; *colla falda acqua freatica livellantesi a 3 metri circa sotto il suolo*.
 6—6,50 Terriccio.
 6,50—10 Sabbia terrosa e ghiaie.
 10—17 Argilla compatta.
 17—21,50 Ghiaietta con *falda acquifera*.
 21,50—23 Sabbia fine.
 23—30 Melma azzurrognola.
 30—35 Sabbia fine; *falda d'acqua che sale al piano del suolo*.
 35—40 Sabbia compatta.
 40—52 Sabbia; *falda d'acqua saliente al piano del suolo*.
 52—55 Sabbia melmosa? *Falda d'acqua leggermente solforosa, saliente a metri 1,50 sopra il suolo; con temperatura di 15°; deflusso di circa 40 litri al 1'.*