

Non ebbi in esame i campioni; la parte inferiore della serie potrebbe essere già pliocenica.

Per **Candiolo** Vedi anche: Vol. I (1912), pag. 32, 33.

Nella regione *Strette* di **Volvera** poco a N.E. di questo paese (N. O. di None) verso i 250 m. s. l. m., la Ditta Balzarini di Torino trivellò, nel 1931, un pozzo che mi fu riferito avere incontrato la seguente serie:

0—3	Terreno agrario e rimaneggiato.
3—5	Terreno sabbioso-ghiaioso, colla 1 ^a falda acqua, freatica, il cui livello piezometrico oscilla attorno ai 5 metri sotto il suolo.
5—9	Sabbia terrosa e ghiaia.
9—9,50	Sabbia terrosa con ghiaia; 2 ^a falda d'acqua.
9,50—11	Sabbia terrosa.
11—19	Sabbia e ghiaia; 3 ^a falda d'acqua abbondante e saliente sino a circa 5 metri sotto il suolo.
19—20,70	Argilla grigiastra.
20,70—28	Ghiaia grossolana; 4 ^a falda d'acqua che si eleva sino a m. 4,93 sotto il suolo.
28—30,75	Sabbia fine melmosa.
30,75—55	Argilla.
55—60	Melma azzurrognola.
60—61,50	Argilla grigio-azzurrognola.
61,50—61,70	Sabbietta; 5 ^a falda d'acqua che si eleva a m. 4,63 sotto il suolo.
61,70—62	Argilla grigiastra.

Nella località frazione *Tetti Oche* e *Tetti Cavalioni* del Comune di **Piobesi Torinese** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

1,80—3,60	Argilla.
3,60—5,60	Sabbia con ghiaia, acquifera
5,60—13	Sabbia con argilla.
13—28,20	Sabbia con ghiaia, acquifera.
28,20—35	Argilla giallastra.
35—58	Argilla azzurrognola.

L'acqua in questo pozzo si livella a 2 m. sotto il suolo e, col pompaggio, presenta la portata di 36 litri al 1".

A **Piobesi** torinese, la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni: