

5,50—12	Ciottoli, ghiaia e piccoli strati di conglomerato.
12—12,50	Conglomerato.
12,50—12,70	Ghiaia.
12,70—13,80	Conglomerato.
13,80—14,40	Ghiaia.
14,40—14,80	Conglomerato.
14,80—15,30	Ghiaietta.
15,30—20,30	Conglomerato.
20,30—20,75	Ghiaietta con ciottoli.
20,75—22,60	Conglomerato.
22,60—23,60	Conglomerato e ghiaia.
23,60—23,80	Conglomerato.
23,80—24,50	Ciottoli con arenaria.
24,50—26,80	Ghiaia con ciottoli.
26,80—27,20	Conglomerato.
27,20—30,00	Ciottoli con ghiaia.
30,00—30,30	Conglomerato.
30,30—30,50	Ciottoli e ghiaia.

Zona acquifera

In questo pozzo l'acqua si livella a metri 5,35 sotto il suolo e, col pompaggio, rende 82 litri al 1".

Nella Cascina di S. Vittore presso **Centallo** una trivellazione eseguita, nel 1931, dalla Ditta Massarenti, nell'attraversare l'alluvione sabbioso-ghiaiosa per 24 metri, trovò *abbondante acqua, livellantesi a -1 metro e con portata, al pompaggio, di 73 litri al 1".*

Presso **Centallo** una perforazione fatta in regione *Madonna dei Prati*, verso Levaldigi, secondo informazioni del Geometra Ruffino, riscontrò:

0—1	Terreno agrario e rimaneggiato.
1—18	Sabbia e ghiaia sciolta, <i>molto acquifera (falda freatica).</i>
18—18,80	Conglomerato.
18,80—	Sabbia e ghiaia sciolta, <i>un poco acquifera.</i>

Nella località *Gerbola* del Comune di **Centallo** per conto dell'Impresa Bertola Antonio, la Soc. An. Massarenti trivellò, nel 1933, un pozzo che attraversò la seguente serie di terreni:

4—10	Ghiaia con ciottoli.
10—11,50	Conglomerato.
11,50—14	Ghiaia con ciottoli.
14—16,50	Ghiaia con interstrati di conglomerato.

Non ebbi in comunicazione i dati idrologici.