

36—40	Ghiaia e sabbia.
40—45	Ghiaia e conglomerato.
45—54	Ghiaia e ciottoli con argilla.
54—57	Ghiaia e sabbia grossa.
57—61	Ghiaia e sabbia fine.
61—62	Sabbia con ghiaietta.
62—67	Ghiaia, conglomerato ed argila compatta.

In questo pozzo l'acqua ha il livello statico a m. 6,90 e quello dinamico a m. 7,15 sotto il suolo e presenta, col pompaggio, una portata di 12 litri al 1".

Nella località **Rizzolo** nel Comune di **S. Giorgio** (Piacenza), per conto dei F.lli Zilli, la Soc. An. Massarenti trivellò, nel 1933, un pozzo che attraversò la seguente serie di terreni:

0—88	(Perforato in precedenza).
88—111,60	Argilla verdastra con piccoli strati di torba.
111,60—113	Argilla calcarea con qualche ciottolo.
113—129,50	Argilla verdastra.
129,50—136,50	Ghiaia <i>aquifera</i> con strati di conglomerato.
136,50—144	Argilla cinerea, calcarea, con qualche ciottolo.
144—144,80	Argilla di tinta verde-scura.
144,80—145,50	Ghiaia con Conchiglie.
145,50—148	Argilla verdastra.
148—149	Torba.
149—150,50	Argilla verdastra.

In questo pozzo l'acqua presenta il suo livello statico a —4 m., ed una portata, col pompaggio, di 7 litri al 1".

La trivellazione raggiunse il Pliocene, ma, senza campioni, non si può meglio precisare.

Nel Campo Sportivo di **Castel S. Giovanni** (Piacenza) la Ditta Massarenti, a conto dell'Ing. Lodigiani, eseguì, da settembre ad ottobre 1933, una trivellazione che attraversò i seguenti terreni:

0—9,50	Avampoio nell'alluvione.
9,50—12	Sabbie, ghiaie, ciottoli ed argilla.
12—13,60	Argilla giallastra con qualche ciottolo.
13,60—16,80	Argilla azzurrastra.
16,80—17,10	Sabbia argillosa, giallastra.
17,10—21	Sabbia cementata.

In questo pozzo l'acqua presenta il suo livello statico a m. —9,20 e quello dinamico a m. —14,50 e la portata, col pompaggio, fu di solo 4 litri al 1".