

Il livello statico dell'acqua è a —5 metri; il livello dinamico a metri 9,80 sotto il suolo; la portata, col pompaggio, è di circa 40 litri al 1".

Questa trivellazione forse raggiunse in profondità il Pliocene superiore, ma in mancanza di campioni non si può precisare.

Per **Torino** Vedi: Vol. I (1912), pag. 40-44 e Vol. II (1924), pag. 17.

Nella località di *Officine Villar Perosa* a **Torino** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1926, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—4,50 (Avampozzo).
- 4,50—9,50 Ciottoli e ghiaia compatti.
- 9,50—18,50 Argilla, ciottoli e ghiaia.
- 18,50—19,50 Conglomerato.
- 19,50—30 Ciottoli e ghiaia; *zona acquifera*.

L'acqua si livella in questo pozzo a metri —11 ed ha una portata, col pompaggio, di litri 29 al 1".

A **Torino** dal novembre 1927 al marzo 1928, la Soc. S.T.I.G.E. fece eseguire nel suo gazometro situato presso la Dora Riparia, alla quota di 224 m.s.l.m., un pozzo che attraversò la seguente serie, di cui il Museo geologico del Politecnico di Torino conserva alcuni campioni al N.º 39.178 d'Inv.

- 0—23 Alluvione sabbioso-ghiaioso-ciottoloso, colla *falda d'acqua freatica che, col pompaggio, ha una portata di litri 7 al 1".*
- 23—40 Marna argillosa compatta, giallastra nella parte superiore (per alterazione a contatto dell'acqua), grigia verso il basso, con fossili marini mal conservati in modo da lasciare dubbi sull'età miocenica o pliocenica. (*Piacenziano*) del deposito.

Nella località di *Corso Francia* (*Stabilimento «Unica»*) nel Comune di **Torino** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1933, per la Società UNICA, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—30,80 (Avampozzo).
- 30,80—31,40 Conglomerato.
- 31,40—39 Ghiaia, sabbia e ciottoli grossi.