

77,10—77,65	Conglomerato.
77,65—78,15	Ghiaia e sabbia con strati di sabbia cementata.
78,15—82,20	Conglomerato.
82,20—82,80	Ghiaia e sabbia con qualche ciottolo.
82,80—84	Conglomerato.
84—85,60	Ghiaia e sabbia con ciottoli; <i>acquifera</i> .
85,60—86,20	Conglomerato.
86,20—89	Ghiaia e ciottoli con sabbia; <i>acquifera</i> .
89—97	Argilla grigio-cinerea.

Il livello statico dell'acqua di questo pozzo rimase a —83 m.; la portata idrica, malgrado il pompaggio, fu di solo 10 litri al 1".

Secondo il proprietario l'acqua in questo pozzo si sarebbe livellata successivamente (dalla falda dei —80 a quella dei —90 m.) a —76 e —70 m. e fornirebbe, nell'insieme, circa 400 litri al 1'.

Questa trivellazione giunse forse sino al Pliocene superiore lacustre.

Presso **Alpignano** (Torino), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

42—43,50	Ghiaia e conglomerato.
43,50—52,20	Argilla giallastra.
52,20—61,50	Ghiaia e ciottoli con conglomerato.
61,50—69	Sabbia, ghiaia e ciottoli conglomerati.
69—79,50	Argilla rossastra.
79,50—82	Argilla giallastra e ghiaia.
82—96,81	Argilla giallastra.

Il livello statico dell'acqua in questo pozzo rimase a —35 metri, e la portata, malgrado il pompaggio, fu di soli 25 litri al 1".

La parte superiore (di cui non ebbi i dati) di questa trivellazione appartiene al fluvio-glaciale; l'inferiore forse ancora tutta al *Diluvium* quaternario, salvo che passi, in basso, al *Villafranchiano*.

Per **Alpignano** Vedi anche: Vol. I (1912) pag. 39.

Per **Rivoli** Vedi anche: Vol. I (1912), pag. 38.

A **Cambiano** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1931, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—12	Argilla verdastra sabbiosa.
12—18	Argilla giallastra compatta.