

- Melanopsis inconstans* N.
 „ *acanthica* N.
 „ *Zitteli* N.
 „ *plicatula* Br.
 „ *Kispatići* Br.
 „ *Visiniana* Br.
Bythinia tentaculata L.
Diana Haueri N.
 „ *exilis* Br.
Pyrgula Haueri N.
 „ *dalmatina* Br.
 „ *inermis* N.
Prososthenia Tournoueri N.
 „ *sepulcralis* P.
 „ *eburnea* Br.
 „ ? *neutra* Br.
 „ *tryoniopsis* Br.
 „ *dalmatina* N.
Hydrobia stagnalis.
Emmericia canaliculata Br.
Fossarulus Stachei N.
 „ *auritus* Br.
 „ *armillatus* Br.
 „ *Crossei* Br.
Pseudamnicola ? *Stošićiana* Br.
 „ ? *Torbariana* Br.
Lithoglyphus panicum N.
Valvata homologyra Br.
Neritodonta imbricata Br.
 „ *Lorkovići* Br.
Dreissensia cymbula Br. (vidi sl. 85—91. na str. 76.)
 Veći dio ovih vrsti živi još i danas u području sredozemnog mora paće dijelomice u vrlo srodnim vrstima, samo su posve izumrli rodovi *Fossarulus* i *Prosostenia*. U sličnim laprima cetinjske doline dolaze također mjestimice mnogobrojni puževi, kako je to kod opisa sinjskog neogena spomenuto.