

ralje. Najviše okamenina našlo se u okolici Mainibraića i Stanišića, a malo i slabo sačuvanih u okolici kaštela Lastova.

Ponajvažnije dosada nađene vrsti su ove :

*B r a h i o p o d a :*

*Productus semireticulatus* Mart.

„ *elegans* Coy.

„ *lineatus* W.

„ *longispinus*.

*Spirifer Fritschii* Schellw.

„ *duplicicosta* Phil.

„ *carnicus* Schellw.

„ *cameratus* Mart.

„ *fasciger* Keys.

„ *rectangulus* Tchern.

„ *increbescens* Hall.

*Orthothetes crenistria* Phil.

*Spiriferella Saranae* Vern.

*Athyris Royssii* Lev.

*Hustedia remota* Eichw.

*Camarophoria alpina* Schellw.

„ *latissima* Schellw.

*Notothyris simplex* W.

„ *exilis* Gem.

*G a s t r o p o d a* (Puževi) :

*Trachydomia Wheeleri* Swall.

„ *carnica* Tornq.

„ *punctata* Tornq.

*Murchisonia subangulata* Vern.

„ *conula* Kon.

*Polyphemopsis peracuta* Meek.

*Loxonema amoenum* Kon.

*Pleurotomaria chesterensis* Meek.

*Euphemus Urei* Flem.

*K o r a l j i :*

*Loxophyllum proliferum* Chesn.

*Amplexus coronae* Frech.

*Zaphrentis* sp.