

Drugoј jednoј bori pripada glavna visoravan Dinare plaine — Troglav —, koja predočuje neravnu, jako krševitu visoku plosninu, nad koju se uzdižu pojedine glavice i kose. Brazdenje slojeva je ovdje obično poprijeko na smjer ovih kosa i stvara unutar visoravni luk. Na sjeveru Velikog Troglava je brazdenje od SSI—JJZ ili SI—JZ, zakreće ali na jugu od ovoga u SZ—JI, a dalje u Z—I smjer. Troglav — visoravan bila je za diluvija (za vrijeme takozv. ledenog doba) dijelomice prekrivena plazurima, kao i najviši vrhunci Velebita.

VIII. Okoliš Splita.

U prostranom obalnom području između Trogira, Solina i Splita pokazuju eocenske naslage, koje same izgrađuju ovaj kraj, takav razvoj, kojim se donekle razlikuju od eocenskih naslaga sjeverne Dalmacije.

Alveolinski vapnenac, koji čini ovdje (na Marijanu) najdublje vidljive naslage eocena, je doduše još jednako razvijen, a tako i na njemu ležeći glavni numulitni vapnenac. Na mjesto grumenastog lapora sjeverne Dalmacije dolaze ali u krovu ovog posljednjeg mnogobrojne kremene kvrge (dresva).

Povrh ovih naslaga slijedi skup laporastih i pjeskovitih slojeva, kojima su uložene naslage vapnenca i kršnika, a ponešto su različiti od lapora sjeverne Dalmacije. Osim značajnih lapora, dolaze naime i tinjčasto-pjeskoviti lapori sa vrlo malo okamenina, ali pokazuju na površini tragova od plazenja životinja i nabrekline (gužve), koje su postale ispunjavanjem pukotina nastalih u mulju za vrijeme suše. Ovaj laporasto-pjeskoviti razvoj kamenja, koji je raširen i dalje u južnoj Dalmaciji i u drugim zemljama (na pr. u Istri) zove se „fliš” (Flysch), pa je običaj, da se eocenske naslage splitske okolice također tim nazivom označuju. Osim navedenog kamenja dolaze ovdje još ulošci od pješčenika, pločastih vapnenaca i gromača.

Okamenina ima u njima mjestimice mnogo, kadšto vrlo malo ili posve manjkaju. Od viših životinja poznato je samo malo preostataka, tako nekoji morski ježevi (*Cyphosoma cribrum* Ag., *Amblypygus* cf. *dilatatus* Ag., *Echinanthus scutella* Lam., *Pygorhynchus lesinensis* Bitt., *Echinolampas* Suessi Laube, *Conoclypus conoideus* Ag., *Conoclypus anachoreta*