


drugom slučaju pločaste kućice, kojima se na površini jasno razabiru spiralni zavoji (Assilina). Numuliti pripadaju najvećim foraminiferama (od nekoliko mm. do više cm. u promjeru).



Sl. 61, 62, 64. Uzdužni i popriječni prerez raznih numulita. 63. Uzdužni prerez od Assilina.

Orbitoidi nalikuju izvana plosnatim numulitima, pa ih neupućeni često zamjenjuju. To su lečaste kućice, često prema rubu naoštrene, a u sredini odebljane, te koje su na površini često prekriveni mnogim kvržicama. Popriječni prerezi, koji su česti u kamenju (glavni numulitni vapnenac, grumenasti lapor, gornji dio srednjeg eocena i gornji eocen) izgledaju sasvim drugačije no kod numulita. Tu motrimo središnji sloj sobica (koje se u usporednom prerezu kod orthophragmina očituju kao koncentrijski namještene pravokutne sobice), a s obiju strana nepravilno namještene sobice, kojima prolaze stupići, a ti stvaraju na površini više ili manje jasne kvržice. (vidi sl. 65— I., str. 58.)

Na površini rastrošenog kamenja mogu se ove tri vrsti, koje su u cijelom srednjem, a dijelom i u gornjem eocenu vrlo raširene i česte, lako razlikovati. Alveoline prikazuju se u obliku bijelih, rastroškom udubljenih pjegica, a numuliti se lako razlikuju od orbitoida, tim što se spiralne lamele na rastrošenoj površini jako ističu.