


Himnites cf. denticostatus, Avicula cf. caudata, Natica cf. pseudospirata, Chemnitzia subcolumnaris, Pleurotomaria Johannis Austriae, Pleurotomaria cf. delicata), krinoida i vapnenih alga (Gyroporella). Umjesto vapnenca dolaze često svijetlosivi dolomiti. Ponajčešće dolaze ovdje isti brahiopodi, što ih dijelomice u ljuštornom vapnencu nalazimo (Terebratula vulgaris, Spirigera trigonella, Spirigera quadriplecta, Terebratula angusta, Spiriferina hirsuta, Spiriferina Mentzelii, Spiriferina fragilis). (sl. 40).



Sl. 40. *Daonella Lommeli*, iz vengenskih naslaga Dalmacije.

U južnoj Dalmaciji (Budva, Spić) nalaze se u naslagama ladiničkog odjela također pretežno šareni pršinci izmjenice sa šarenim dresvama, koje zajedno stvaraju često debele slojne skupine. U to naime doba probile su velike množine eruptivnog kamenja (noritporfirit) kroz ljuštorno vapno u obliku trupina, a čini se, da se je to kamenje prelilo i poput pokrova preko ljušt. vapna, a sada je prekruto spomenutim pršincima. Prema gore ponestaju pršinci sve više, a mjesto njih vidimo pločaste vapnence sa dresvom. Napokon ih posve nestaje, pa ih zamjenjuju tamni i crni škriljavci. Na drugim mjestima je gornji odsjek ovih naslaga inako razvijen, tako između Stanišića i Manžića, gdje se te naslage završuju čestom izmjenom šarenih (obično crvenih) laporastih škriljevaca, crvenih vapnenaca i šarene dresve.

Po okameninama (*Daonella* cf. *cassiana* Mojs., aff. *Richt-hofeni* Mojs. i *Waldheimia Eudora* Laube kod Dzurmanja u Spiću) vidi se, da slojevi iznad pršinaca pripadaju gornjim ladiničkim — kassianskim — naslagama, dočim u pršincima mjestimice dolazi velika množina *Daonella Lommeli* Wissm.