

- Naticopsis sp. ind.
 Ennemopsis sp.
 Astralium n. sp.
 Loxonema arctecostatum Münt.
 „ cf. Haueri Laube.
 „ cf. obliquestriatum Münt.
 „ insocialis Kittl.
 „ Kokeni Kittl.
 Undularia aff. Ambrosinii Stopp.
 „ cf. Pillae Stopp.
 Spirostylus subcolumnaris Münt.
 „ subcontractus Kittl.
 Trypanostylus (?) flexuosus Münt.
 „ aff. geographicus Stopp.
 A m o n i t i :
 Arcestes aff. Bramantei Mojs.
 „ angustus Hauer.
 Ceratites subnodosus Mojs.
 „ aff. brebanus Mojs.
 Ptychites cf. Studeri Hauer.
 Proteites retrorsoplicatus H.
 „ cf. robustus H.
 „ aff. Kellneri H.
 Procladiscites Brancoi Mojs.
 Megaphyllites sandalinus Mojs.
 Monophyllites Suessi Mojs.
 Sturia Sansovinii Mojs.
 Acrochordiceras Damesi Noetl.
 Hungarites sp.
 Celtites Michaelis Mojs.
 Balatonites aff. hystrix Arth.

Amoniti su ovdje redovito savršenijeg ustrojstva, no oni iz gornjih verfenskih naslaga, pa su im lobi i sedla narezuckana i razgranjena. Vapnenci, u kojima dolaze uklopljeni obično su crveno išarani i kvržasti, te čine lečaste uklopine u laporasto-pješčanim naslagama. Tako na pr. kod Stojanovića i Prentovića, između Stanišića i Manžića (Mahini kratnji). Puževa ima osobito mnogo u okolici Stojanovića i Prentovića.