

vapnenci sa tankim ulošcima tamnog kremenata koji pripadaju lemeš-naslagama. Na ovima leže dobro vrstani sivi vapnenci, dolomiti i crvenosivi pjegasti vapneni kršnici, koji padaju najprije na sjeveroistok, onda ali na jugozapad t. j. sinklinalno. I uz put prema Popovoj kući vidimo jasno ove iste naslage ležati na kremenim škriljancima.

Zatim slijedi uska kvarterom ispunjena uvala, za kojom se obliče kamenja promijeni. Odsele naime vodi cesta sve do Stare straže u debelovrstanim vapnencima, koji odgovaraju jurskim cladocoropsis-vapnencima u Velebitu. Uz cestu nađeni su dosada u njima lih nejasni tragovi od brahiopoda. Kremeno li sada od Stare straže cestom prema Plavnu, to vidimo najprije sive, bijele i crvenkaste dolomite, dolomitične kršničaste vapnence, i takove sa pjegama nalikima na Lithiotis. Daskora ali pojavljaju se pod ovima tankovrstani i pločasti sivi vapnenci puni okamenina (sa naklonom prema jugu i jugoistoku), koji su izmjenice vrstani sa dolomitima bez fosilija. Uz ostale i u Velebitu nađene okamenine određuje bezbroj Lithiotisa njihovu pripadnost k srednjem liasu.

Ispod lithiotis-naslaga leže u čestoj izmijeni dolomiti i vapnenci donjeg liasa bez okamenina, a napokon kod Marića nastupaju pod njima bijeli gornje triadijski vapnenci Debelog brda, koji uz dolomite motrimo sve do jaruge između Mauk-Miljevića.

Ovi bijeli vapnenci su mjestimice vrlo bogati okameninama osobito u okolini gostione Ciganović (Rasulo), gdje nalazimo školjke (*Pecten* i *Pseudomonotis*), puževe, brahiopode (*Terebratula vulgaris* i *Spirigera trigonella*), sitnih amonita i debelih držaka od krinoida, a mjestimice ima u njima dosta *Gyroporella*. Uz obronak Debelog brda uloženi su u tim vapnencima na više mjesta šarene, crvene i sive gline.

Kod uspona puta prema rečenom brdu prelaze dolomitični vapnenci u prave dolomite, ispod kojih leže konkordantno isto tako položito kao i oni, sivi grumenasti pločasti vapnenci prepuni kvrgolikih grumena od dresve. Idući dalje spuštamo se preko naslaga od kremenih vapnenaca i sivih, smeđih, rdasto-žutih škriljavaca, koji su često izmjenice vrstani, dolje do jarka, a tim smo prošli skupinu vengenskih i buhensteinskih naslaga.