

Obzirom na ovu veliku množinu amonita je broj ostalih životinjskih vrsti malen, ako ih i svuda u gornjim verf. naslagama imade. Dosada nađene su u Dalmaciji ove vrsti :

Školjkaši :

Pseudomonotis Kittli Bittn.

„ *Venetiana* H.

„ cf *Benecke* Bitt.

„ *inaequicostata* Ben.

„ *hiunilidea* Bitt.

„ cf *asperata* Bitt.

„ *Telleri* Bitt.

Myophoria laevigata Alb.

„ *Goldfussi* Alb.

Anodontophora sp.

Gervilleia exporrecta Lep.

„ *polyodonta* Stromb.

Puževi :

Turbo rectecostatus Hauer.

Natica costata Münst.

Koralji :

Rhizocorallium jenense Zenk.

U najjužnijem dijelu Dalmacije su gornje verfenske naslage drugačije razvijene nego ove, što smo ih opisali. U području Budve i Spića nalazimo ih u obliku sivih i crvenih dolomita, koji su uvijek jasno uslojeni, pa u debelim naslagama nasloženi. Duboko ispod najgornjih slojeva dolaze u njima tanke vrste i žice zelenkastosivoga lapora i vapnenca sa ljušturama. U tim naslagama dolaze iste okamenine, koje inače nalazimo u zelenosivim laporastim vapnencima gornjih verfenskih naslaga (Tirolites, *Naticella costata*, *Turbo rectecostatus*).

Srednji trias — ljuštuno vapno

U srednjoj Dalmaciji (Knin-Sinj-Svilaja) leži na pločastim vapnenim laporima gornjih verfenskih naslaga slog bijelih gromadnih vapnenaca, koji su gdjekada zamijenjeni svijetlosivim dolomitom. U tim vapnencima nalazi se samo vrlo malo okamenina, a ima u njima, kao i u dolomitu *gyroporella*.