

Populus latior A. B. var, *rotundata*.

Carpinus grandis Ung.?

Stapke od Characea (osobito kod sv. Jurja),
te u neogenu kod Selina (Bilibrig) na podvelebitskom kanalu :

Bumelia oreadam Ung.

Juglans parschlugiana Ung i
komadi od trske.

Mnogo rašireniji su u neogenskim slatkovodnim laporima ostanci od puževa i školjkaša. No te su okamenine samo na nekim mjestima obilne, iščega proizlazi, da su u tim neogenskim jezerima postojale samo mjestimice i samo katkada za životinjstvo povoljne životne prilike.

Među okameninama mekušaca, koji su po svoj Dalmaciji u tim naslagama rašireni, nalazimo osobito kučice, kamene jezgre i poklopce od *Bythinia tentaculata*. Ovaj maleni vodeni pužić živi još i danas u Dalmaciji i nije se od onog vremena gotovo ni malo promjenio. Isto tako dolaze na većini naiazišta zdrobljeni komadi ili kamene jezgre od školjkaša i to od uniona (*lisanka*), kongerija i dreisena, koji su se prilagodili životu u slatkoj vodi, a rođaci su morskih opće poznatih jestivih daganja (*klapunica*, *Mytilus edulis*).

Mnogo obilnije od školjkaša zastupani su puževi, no samo na nekim mjestima, kao na pr. kod Miočića u Petrovom polju, gdje su ovi lapori prepuni puževa. Brusina i Neumayer opisali su sa toga nalazišta poglavito ove puževe :

Helix Schlosseriana Br.

„ *subcarinata* A. B.

„ *cf turonensis* Desh.

Succinea drnisana Br.

Succinea Martinovići Br.

Ancylus illyricus Neum.

Orygoceras cornucopiae Br.

Limnaeus subpalustris Th.

„ *Korlevići* Br.

„ *Klaići* Br.

Planorbis cornu Brongn.

„ *applanatus* Th.

„ *dalmaticus* Br.