

— Elitre più o meno acuminata all'apice. Colorito variabile, elitre unicolori, azzurre o verdastre, alle volte leggermente brune, di rado con macchia omerale; pronoto con microscultura evanescente sul disco; 5.5 - 8 mm. Gruppo del *fasciolatum* ²¹⁾.

36). Zampe e antenne meno lunghe, il 3.º art. non più lungo degli occhi visti di sopra (37). — Zampe e antenne lunghe ed esili, il 3.º art. più lungo degli occhi visti di sopra. Corpo nero-bluastro, le tempie lunghe e leggermente ristrette verso il collo, elitre coll'apice arrotondato, convesso; 6 - 7.5 mm. 103. *longipes*.

37). Elitre allungate, depresse, leggermente brune, coll'apice acuminato, poco convesso, fortemente striato, e con microscultura evidente, poligonale; le tempie più ristrette che nel *longipes*, però meno che nelle due specie seguenti; 5.2 - 6.5 mm. 102. *complanatum*.

— Elitre meno allungate, verdi o bluastre, coll'apice più convesso, meno acuminato oppure arrotondato e con microscultura molto sottile, a maglie trasversali; le tempie brevi e bruscamente ristrette (38).

38). Statura maggiore, apice delle elitre arrotondato, microscultura sottilissima, a maglie fortemente trasversali, colorito nero-azzurro o leggermente verdastro; 4.5 - 6 mm. 100. *tibiale*.

— Statura minore, apice delle elitre leggermente acuminato, microscultura a maglie meno trasversali, colorito piuttosto tendente al verde che all'azzurro; 4.5 - 5.5 mm. 101. *Redtenbacheri*.

39). Pronoto senza piega postangolare ²²⁾. Elitre allungate, appiattite, con reticolo microscopico trasversale (40). — Con piega postangolare (41).

40). Elitre azzurre, verdi o bronzate, con 4 macchie gialle o rossiccie; i femori, più o meno nerastri, le antenne di solito annerite dal 3.º art. impoi; 4.6 - 5.1 mm. 121. *oblongum*.

— Elitre giallo-brune, con disegno a croce più scuro, talvolta poco evidente; i primi tre art. delle antenne e le zampe totalmente gialle; 4.5 - 5.5 mm. 122. *testaceum*.

41). Elitre di una tinta più o meno uniforme, metallica o bruna, o gradatamente diversa ai margini o all'apice, però senza macchie distinte nè disegno a croce (42). — Elitre scure con due o quattro macchie gialle ²³⁾, oppure gialle con disegno scuro a croce (47).

21) Per la distinzione delle 3 specie — *fasciolatum*, *Bugnioni* e *coeruleum* — vedi i caratteri differenziali a pag. 82.

22) Vedi anche *B. terminale* Heer. della Alpi e del Caucaso. Elitre più ampie e convesse, con microscultura poligonale; verde e bluastro, con macchia preapicale rossiccia. — *B. ripicola* Duf. del Mediterr. occid. Elitre appiattite, rosse nella metà basale, azzurre o verdi nell'apicale.

23) Con due sole macchie: *B. lunatum* Duft. Corpo verde-bronzato, le due macchie si uniscono alla sutura e formano una specie di lunetta gialla preapicale; 5.5 - 6.5 mm. Eur. media.