

313. **A. (Triaena) spec.** — Un unico es. dell'Isola Morosini alla foce dell'Isonzo, 30.5.08 (May). — Non avendo potuto determinare con sicurezza la specie, ne dò una breve descrizione:

Un poco più piccola e più stretta della *fulvipes*, picea, con leggero riflesso bronzeeo; delle antenne i tre primi articoli e la metà del quarto giallo-rossicci; i femori neri, le tibie rosso-brune, i tarsi più scuri; i palpi quasi totalmente neri. Gli angoli ant. del pronoto un poco più acuti e sporgenti che nella *fulvipes*; la base del pronoto quasi affatto liscia, anche tra le impressioni interne; le impressioni esterne ben marcate da una linetta obliqua negli angoli post. Le strie delle elitre meno distintamente punteggiate che nella *fulvipes*; la stria scutellare con un poro ombelicato alla base. I due primi sterniti addom. punteggiati ai lati. Lungh. 8,5 mm.

314. **A. rufipes** Dej. (Eur. media mer., Reg. mediterr.). — E' stata segnalata dai dint. di Fiume (*Pad.* 114). Io non ho veduto ancora alcun es. della reg. adriatica. Troverebbesi però in Grecia (Veluchi, teste Oertzen) e nell'Asia min. (nelle lande deserte, salmastre, pr. Konia).

315. **A. tricuspidata** Dej. (Eur. media, Caucaso, Siberia). — Egualmente indicata nel territorio di Fiume (*Pad.* 114). — E' stata trovata anche in vari punti della Balcania (Bosnia, Bulgaria, Epiro, Grecia).

316. **A. plebeja** Gyllh. (Eur. sett. e media, Siberia). — Troverebbesi presso Fuzine, nel retroterra croato di Fiume (*Apfb.* 298).

317. **A. (Amara s. str.) similata** Gyllh. (Dej III, 461, Schaum 522, Putz. 12, Ganglb. 316, Reitt. 160. — Eur., Siberia). — Abbastanza diffusa nella parte sett. della V. G., lungo i sentieri campestri, vagante sul suolo e sull'erbe dei prati, spec. in primavera, però anche più tardi fino in VIII, poco com.; un es. molle alla fine VII, presso Volzano. — Carnia e Friuli: Villa Santina, Magnano, Nogaro, Muscoli, Aquileja, Ronchi, Monfalcone. — Goriziano: Volzano, Salcano, Gorizia, Aidussina. — Trieste: Montebello, Altipiano Carsico, Senosecchia. — Fiume: Belvedere; nel retroterra a Grobnico e Fuzine.

318. **A. ovata** Fabr. (Schaum 523, Ganglb. 316, Reitt. 160. — Eur. media, Caucaso, Siberia). — Piuttosto rara nella parte sett. della V. G. — Carnia: reg. montana (*Gortani* 61); Torlano 6.25 (Vallon 2). — Goriziano: Selva Tarnova 6.23 (Ch e R 2); Aidussina (Schr 1). — Retroterra di Trieste: Lipizza 5.21 e 4.22 (M 3); Senosecchia 7.26 (Stolfa 1). — Istria montana: Lisina, a sud-est di Mune (Dep 1).

319. **A. montivaga** Sturm (Schaum 524, Putz. 15, Ganglb. 316, Reitt. 161. — Eur. media montana). — Abbastanza diffusa nel nostro retroterra alpino e montano, però piuttosto rara, V-VII. Il colorito è di solito bronzeeo o verde; di rado nero (Carnia-Vallon, 1 es.). — Carnia: M. Flop (R 1); nel bosco di Carpinì sopra Tolmezzo (*Gortani* 61). — Alpi e Prealpi Giulie: Jof Fuart, M. Nero di Bochinia, M. Nero di Tolmino, Plava (dinanzi alla Divlja jama), Selva Tarnova, Dol, Selva del Piro, Luegg. — Retroterra liburnico: Nevoso (Hermsburg), Val Recina, Fuzine.