

Loc. class.: M. Maggiore in Istria. Vive tanto all'aperto sotto sassi, nelle faggete sotto la vetta, quanto in una piccola voragine sotto il rifugio, 5.912 e 5.921 (Winkler, plur). Gli es. raccolti all'aperto hanno il pronoto in media più cordiforme.

Questa razza è descritta col nome di *Soosi Csiki* anche dal retroterra fiumano: M. Risnjak (loc. class.); Bitoraj 5.912 (Winkler 1) e Bjele Stiene presso Jasenak, nel gruppo della Vel. Kapela 1922 (Jureček 1). La larghezza del capo e la convessità delle tempie non servono affatto per distinguere questi es. croati come una razza a sé, trattandosi di caratteri che variano notevolmente anche tra gli es. del M. Maggiore.

185. **A. tolminensis** Müll. (*hirtus tolminensis* Müll. Atti Accad. Ven. - Trent. - Istr. 1922, 23; *Mayeri tolminensis* Jeannel 1926, 56). — Il contorno delle elitre è notevolmente diverso da tutte le forme dell'*A. hirtus* s. l. e ricorda piuttosto l'*A. Egonis* (vedi la fig. 12 presso Jeannel 1926, pag. 50). Anche la punta del pene, estremamente sottile e lunga, non trova riscontro in nessuna altra razza del gruppo *hirtus*. — Loc. class.: Grotta Dante pr. Tolmino, ove è però estremamente raro. Un paio di elitre sono state trovate già nel 1909 (Ku); i due unici es. interi finora conosciuti sono stati raccolti nel 1914 dal dott. Stefano Jureček di Praga. Parecchie altre visite della Gr. Dante, per rintracciare questo anoftalmo, rimasero infruttuose.

— **A. nivalis** Müll. (Jeannel 1926, 58; *hirtus nivalis* Müll. Atti Accad. Ven. - Trent. - Istr. 1922, 27.). — Ai caratteri già rilevati nella tabella aggiungo ancora i seguenti: il capo conformato circa come nell'*A. hirtus*, i solchi frontali indistinti nel tratto posteriore. Il pronoto appena più largo del capo, leggermente sinuato dinanzi alla base, per lo più con 2 pori setigeri anteriori; il margine laterale del pronoto molto stretto nel ♂, più largo nella ♀. Elitre appiattite, dilatate all'indietro, l'angolo suturale arrotondato o smussato; quattro punti setigeri dorsali. — Loc. class.: Alpi Giulie, Tricorno. E' stato scoperto al margine di un nevaio presso il rifugio «Kredarica» su terreno jugoslavo, però a breve distanza dall'attuale confine, 8.920 (Gspan, 2 soli es.). E' l'unico anoftalmo non cavernicolo del gruppo dell'*hirtus* s. l.

186. **A. Micklitzi** Ganglb. (Denkschr. Akad. Wiss. Wien 1913, 21, tipo: Častiljiva jama pr. Radmannsdorf; *hirtus pars*, Müll. 1913, 59; *hirtus pars* + *ajdovskanus*, Jeannel 1926, 50 e 54. — Carniola, parte nord-occidentale; Selva di Tarnova). — Da noi soltanto la seguente razza:

a) **Micklitzi Ravasinii** Müll. (*hirtus* sbsp., Müll. Atti Accad. Ven. - Trent. - Istr. 1922, 26; *ajdovskanus* sbsp. Jeannel 1926, 54). — Collima perfettamente col *typ. Micklitzi* della Carniola per quanto riguarda la forma del capo, del pronoto e delle elitre, solamente il pezzo mediano del pene molto più breve, non più lungo che largo, e l'apice stesso del pene più largo e più ricurvo. 6-6.7 mm. — Loc. class.: Selva di Tarnova, una piccola grotta pr. Anska Lazna, pochi es. 22.5.21 (M, R).