

trovasi nell'interno dell'Istria: Pinguente, 5.913 (coll. Novak 3 es.) e Ospò, all'entrata della grotta sopra il villaggio, 8.19 e 7.23 (Ch. plur.).

Nota. — L'amico *Luigioni* (Atti Accad. Pont. Nuovi Lincei, 1921, estr. pag. 3) ritiene il *B. Fauveli* Ganglb., della Italia, come specie distinta dal *praeustum* della Balcania. Ho riesaminato alcuni es. del Lazio e della Toscana e trovo che si tratta di una razza occid. ben poco differente dal vero *praeustum*, per statura maggiore e, talvolta, anche per la presenza di alcuni puntini nella parte post. del capo, dietro i solchi frontali.

112. **B. Stephensi** Crotsch. (Ganglb. 165, Apfb. 116, Reitt. 116, Net. Ent. Blätt. 1917, 233, Müll. 86. — Eur. media e sett. su terreno argilloso, boschivo). — Raro nel retroterra mont. di Trieste e dell'Istria: sopra Roditti, 5.08 (Kr 2); Castellaro Maggiore, presso la sorgente sotto la vetta, 5.20 (M 1); Castelnuovo (Bl 1).

113. **B. brunnicorne** Dej. (Spec. V, 141, tipo: Dalmazia; Schaum 709, Apfb. 98 e 116, Müll. 87; *brunnicorne* pars, Ganglb. 166 e Reitt. 116. — Alpi, Italia, Balcania, Carpazi). — Nella zona bassa del Goriziano, del Friuli e dei dint. di Trieste, lungo i ruscelli, spesso assieme al *B. dalm. latinum*, però più raro, III - VII e IX - X; es. immaturi in V e VI. — Prestento pr. Cividale, alle sponde del ruscello che esce dalla caverna detta «Foram di Landri» (Messa 3); Na Mokrim pr. Gorizia (Spr 2); Aidussina (Bianchi, in coll. Net 1 es. assieme al *B. nitidulum*); lungo i ruscelli della zona arenacea dei dintorni di Trieste e poi lungo la riviera di Barcola-Miramare fino a Grignano; sull'altipiano di S. Servolo pr. Occisla (Sauli 1).

114. **B. ustulatum** L. (Ganglb. 163, Apfb. 115, Reitt. 119, Müll. 93; *litorale* Ol., Schaum 697. — Eur., Asia occid., America). — Abbastanza diffuso, però non troppo frequente, nel Friuli, nel Goriziano e nei dint. di Trieste, dalla zona litoranea fino in montagna. Vive lungo i corsi d'acqua o nei prati umidi e nei giardini, sotto sassi, III - VII e IX - X. Es. immaturi in autunno. — Carnia e Friuli: Villa Santina, Udine, Palmanova, Pieris, Monfalcone, Grado, Is. Morosini. — Goriziano: Nevea 7.22 (Ch 4), Gorizia, Podgora, Doberdo. — Dint. Trieste: Boschetto, S. Giovanni, Roiano, Terstenicco, Barcola, Miramare, Grignano; nel Vallone di Muggia alla Rosandra pr. Gorenji Konc e lungo il Recca d'Ospò; sull'altipiano pr. Comeno, 3.20 (Ch 1) e lungo il Timavo sup. pr. S. Canziano. — Liburnia: Hermsburg, Nevoso (Sim).

115. **B. occidentale** Müll. (Col. Rundschau 1918, 96; *Andreae* pars, auct. nec Fabr. — Reg. mediterr. occid., dal Portogallo fino in Istria). — Questa specie, comunissima in Italia, trovasi anche da noi, però meno frequente, nella zona bassa del Friuli e dell'Istria lungo i fiumi. Manca in Dalmazia e in Balcania. — Friuli: Pieris, lungo l'Isonzo, 10.06 (M 1) 3.22 (Sch 1); Is. Morosini, 5.08 (May 2). — Istria: Decani, lungo il Risano, 5.09 (Spr 3); Levade, sulle sponde argillose del Quieto 4.23, plur (M); Arsa (Net 2).