

2. Elitre con debole sinuosità apicale. Pronoto nella metà anteriore meno arrotondato e meno ampliato, coll' orlo basale completo; la striatura microscopica delle elitre un poco più distinta; zampe giallo-rossiccie.

280. *laevicollis*.

— Elitre con forte sinuosità apicale. Pronoto nella metà anteriore più ampio e più arrotondato, l'orlo basale nel mezzo più debole o mancante; eltre con microscultura assai debole, talvolta indistinta; zampe spesso più scure.

281. *Knauthi*.

280. T. (*Asmerinx*) *laevicollis* Duft. (Schatzm. Boll. Boc. Ent. Ital. 1926, 35; *Car. laevicollis* Duft. Fn. Austr. II, 163, *tipo*; Linz; *Harpalus laevicollis* pars, Schaum 586, Ganglb. 355, Reitt. 174 e Tab. 96. — Eur. media montana, Alpi dinariche). — Da noi esclus. in montagna, dai 900 m in su, nei boschi di faggio sotto i sassi, abbastanza frequente V - VII; in VIII - IX anche es. immaturi — Carnia: nella reg. subalpina e alpina com., (Gortani 62); M. Talm (Vallon) e Paularo (Gagliardi). — Tarvisiano: Tarvisio e Fusine Laghi. — Göriziano: Jôf Fuart, Mangart, Tricorno, Val Vrata, Val Trenta, M. Nero di Bohinia, Nevea, Canin, Matajur, Cobilaglava pr. S. Lucia, Selva Tar-nova. — Retroterra di Trieste: Monte Re (Nanos) e Javornik. — Istria: M. Taiano e M. Maggiore. — Retroterra di Fiume: M. Nevoso; Bitoraj e Lič in Croazia.

281. T. *Knauthi* Ganglb. (Verh. zool. Cot. Ges. Wien 1900, 577, *tipi*: Vallarsa, Trentino; Müller, Ent. Blätter 1916, 81; Schatzm. Boll. Soc. Ent. Ital. 1926, 36. — Alpi mer.-orient.). — Rarissimo nelle Alpi e Prealpi Giulie: M. Nero di Tolmino (Kern), presso il Lago inferiore, 8.910 (Gabr 1); Chiapovano 7.910 (Pr 1). — Carnia: M. Raut 8.26 (Spr).

### Gen. *Stenolophus* Dej.

#### Tabella delle specie europee:

1. Pronoto interamente giallo-rossiccio. — 2.
- Pronoto nero o bruno, col margine lat. giallo. — 5.
2. Pronoto ristretto verso la base in linea retta, gli angoli post. ottusi; eltre più strette e allungate che nel *teutonus*, di colore giallo-rossiccio, di solito alla sutura con una macchia nerastra, la quale resta ben distanziata dall' apice. [ *discophorus* Fisch.]
- Pronoto con angoli post. arrotondati; eltre di rado unicolori, giallo-rossiccie, di solito con macchia nera, iridescente, che si estende fin verso l' apice. — 3.
3. La base del pronoto orlata verso gli angoli post.; gli occhi più piccoli e meno sporgenti, di conseguenza la testa più stretta. Elitre totalmente giallo-rossiccie, oppure con una leggera macchia iridescente verso l' apice (ab. *affinis* Bach). 283. *skrimshiranus*.
- Soltanto i lati del pronoto orlati; gli occhi più grandi e sporgenti, di conseguenza la testa più larga; eltre di solito con macchia nera, iridescente, più ampia e distinta. — 4.