

12. Il ♂ con unghie ant. simmetriche, eguali, la ♀ con punteggiatura microscop. su tutte le elitre. Le strie nere delle elitre di solito intere, non interrotte, però alle volte poco evidenti. Specie più breve che il *lineolatus*, più convessa, le elitre più arrotondate ai lati, il protorace un poco più breve e più stretto, 2.5-3.7 mm. — Europa settentrionale - occidentale. [nomax Balf. Browne]
- Il ♂ con unghie ant. disuguali, la ♀ con punteggiatura microscop. verso l'apice delle elitre. Elitre con strie scure leggermente interrotte e tendenti alla formazione di macchie, 2.5-2.8 mm. (*H. Wehncke* Gerh., *borealis* Gerh., *transversus* Thoms.) — Eur. sett. e media, Siberia. [lineolatus Mannh.]
- Il ♂ con unghie ant. disuguali, le elitre della ♀ senza microscultura, nemmeno verso l'apice. Elitre con strie nere longitud. non interrotte. 2.8-3 mm. (*H. fluvialilis* Er. e Thoms.). — Eur. sett. e media, Siberia. [immaculatus Gerh.]
13. Il metasterno perfettamente piano, senza fossetta mediana, il capo ingrossato. — Corpo allungato, giallo-rossiccio; il margine ant. del pronoto incavato dietro gli occhi, di conseguenza la parte mediana protratta all'innanzi; elitre con file di punti di mediocre grossezza, il primo punto della 4.a e 5.a stria di solito ingrossati; 4-4.3 mm. (*H. siculus* Wehncke). 492. **mucronatus**.
- Metasterno con fossetta o depressione mediana. — 14.
14. Le spalle arrotondate e incurvate verso la base del pronoto, in modo che risulta un'angolo rientrante al punto d'incontro dell'orlo omerale col margine laterale del pronoto. Prosterno leggermente solcato; elitre della ♀ totalmente coperte di puntini microscopici. Colorito giallo-rossiccio, elitre gialle, per lo più con sottili linee nerastre, interrotte; 3.5 mm. 496. **laminatus**¹⁾.
- Il contorno del corpo non presenta un'angolo evidente tra le elitre e il pronoto, l'orlo omerale forma quasi la continuazione rettilinea del margine laterale del pronoto. Prosterno di solito piano o convesso; elitre senza microscultura in ambo i sessi. — 15.
15. Corpo totalmente giallo, elitre senza macchie, solamenti i punti delle strie bruni o nerastri. I lati del pronoto perfettamente diritti, convergenti, il margine ant. non protratto nel mezzo; elitre con strie di punti piuttosto grossolani, quelli alla base non ingrossati. 3.5-4 mm. 495. **flavicollis**²⁾.
- Le elitre più o meno distintamente macchiate (16).
16. Pronoto con una serie di punti molto grossolani alla base; le tibie post. fortemente punteggiate e pubescenti sulla faccia esterna. Statura allungata, colorito ferrugineo, elitre con macchie brune

1) L' *Haliplus lombardus* Fiori viene considerato da ZIMMERMANN (Tab. 1924, 80, nota) come una forma del *laminatus* a spalle meno convesse.

2) L' *Haliplus unicolor* Fiori, della Sicilia, è stato messo da ZIMMERMANN in sinonimia del *flavicollis*. L'autore tedesco non crede che la forma meno ovale, più ellittica, e le strie di punti più deboli siano caratteri sufficienti per una distinzione specifica.