

42). Elitre con microscultura almeno sul declivio apicale (43). — Elitre perfettamente liscie e lucenti, senza microscultura²⁴⁾. Corpo sup. azzurro o verdastro, zampe gialle coi femori neri alla base, in es. non del tutto maturi anche i femori completamente gialli; 5 - 6 mm.

110. *dalmatinum*.

43). Elitre totalmente metalliche o più chiare all'apice (44). — Elitre totalmente brune o l'apice più scuro, leggermente verdastro; zampe e antenne giallo-rossiccie, oppure quest'ultime un poco più scure verso l'apice; 5.5 - 7 mm.

111. *praeustum*.

44). Statura minore, 4 - 5.5 mm (45). — Statura maggiore. Palpi e zampe gialle, i femori degli es. maturi più o meno anneriti alla base; corpo verde metallico, elitre ovali, talvolta rossastre all'apice; 5.5 - 6.5 mm.

12. *Stephensi*.

45). Il penultimo art. dei palpi mascellari bruno o nerastro²⁵⁾, anche i femori sempre più o meno nerastri, salvo l'apice. Corpo sup. unicolore, tra il verde e l'azzurro; elitre ovali, con strie di punti piuttosto grossolani e microscultura visibile colla lente soltanto verso l'apice (*f. typ.*); oppure elitre più strette, con strie più sottili e microscultura evidente anche alla base (sbsp. *alpinum* Dej.); 4.5 - 5.5 mm.

109. *nitidulum*.

— Il penultimo art. dei palpi giallo o leggermente annerito all'apice, le zampe totalmente gialle²⁶⁾. Corpo sup. unicolore, azzurro o verdastro, elitre allungate, con microscultura più o meno limitata alla regione apicale; 4 - 4.5 mm.

113. *brunnincorne*.

46). Elitre allungate, zampe totalmente gialle. Corpo sup. azzurro o violaceo, simile per statura e grandezza al *brunnincorne*, però la base del pronoto più larga, le strie elitr. più sottili, all'apice e ai lati quasi totalmente svanite; 4 - 4.5 mm. Vive alla spiaggia del mare.

118. *Steinbühléri*.

— Elitre meno allungate, femori neri, eccetto l'apice. Corpo sup. verde metallico, simile al *nitidulum*, però molto più piccolo. Le strie elitr., specialmente le esterne, più fortemente punteggiate che nello *Steinbühléri*, le antenne alquanto più brevi 3.5 - 4 mm. Vive lungo i corsi d'acqua.

119. *hypocrita*.

²⁴⁾ Vedi anche *B. Lafertei* Duv. Corpo bicolore, anteriormente metallico, elitre brune; 5.5 - 7 mm. Corsica, Sardegna.

²⁵⁾ Vedi anche *B. Gautieri* Net. (*juridipes* Gaut.) della Corsica. Egitre bruno-rossiccie, con riflessi verdastri più o meno evidenti; 4.5 - 5 mm. — Qui andrebbe inserito anche il *B. alticola* Fiori, della Maiella (Abruzzo), che però non presenta alcuna affinità col *nitidulum*. Ne differisce per le elitre appiattite, zigri-nate, con strie sottili, evanescenti, ed i solchi frontali più brevi; corpo sup. bronzato, antenne annerite dal 3.0 art. impoi, zampe rossastre; ale rudimentali; 4.2 mm.

²⁶⁾ Vedi anche *B. Milleri* Duv. dell'Eur. centr. Corpo verdastro, elitre allungate, rossiccie verso l'apice; la base del pronoto un poco più stretta, gli omeri più arrotondati che nel *brunnincorne*. — *B. nitidulum* sbsp. *pallidicorne* m., del M. Viso, elitre ovali, verdi, zampe, antenne e palpi quasi totalmente giallo-rossicci.