

- Statura molto allungata, di rado piuttosto ovale (*G. distinctus*), in tal caso la doccia laterale dell'elitre egualmente stretta dalla base fino all'apice. — 11.
10. Elitre con striatura più uniforme, le strie interne poco più sottili delle esterne; la parte inf. del petto e dell'addome di solito completamente nera, anche le epipleure talvolta più scure. Il contorno del corpo meno ampio; le elitre senza microscultura. (Sin. *mergus* Ahr.). — Germania, Eur. sett., Siberia. [natator L.]
- Le strie interne molto più sottili delle esterne, talora evanescenti; il mesosterno e di solito anche tutto lo sternite anale di colore rossiccio. Statura più ampia e convessa; le interstrie di solito perfettamente lisce, nella var. *corpulentus* Schatz. con puntini minutissimi, ma distinti. (Sin. *natator* Ahr.). 565. **substriatus**.
11. Statura poco più allungata che nel *natator*, le elitre di solito con finissima microscultura a puntini appena percettibili. Differisce dalle due specie precedenti per la doccia laterale delle elitre egualmente stretta e per il pene leggermente dilatato verso l'apice. Mesosterno e sternite anale rossicci. (Sin. *colymbus* Er., *caspius* Rég.) 565. **distinctus**.
- Statura di solito molto più allungata e più stretta che nel *natator*, le elitre senza microscultura regolare. — 12.
12. L'apice delle elitre quasi troncato e l'angolo apicale esterno evidente; mesosterno e sternite anale rossicci. Statura variabile, talvolta molto allungata, lateralmente compressa, quasi cilindrica (ab. *angustatus* Aubé); oppure meno allungata, coi lati del corpo leggermente arrotondati. Gli es. meno allungati si avvicinano alla forma del *distinctus*, ma ne differiscono per l'angolo apicale esterno più marcato ed il pene un po' più stretto (Sin. *elongatus* Aubé, Rég., Seidl., *distinctus* Suffr., Ksw., Sharp, *celox* Schioedte, *mergus* Sturm). 567. **caspius**.
- Elitre meno distint. troncate, l'angolo apicale esterno perfettamente arrotondato; mesosterno o sternite anale spesso più scuri; statura più costante, molto allungata, i lati leggermente convessi; il pene fortemente assottigliato nella parte apicale. (Sin. *celox* Zaitzev). — Eur. media e settentr., Siberia. [bicolor Payk.]

564. **G. distinctus** Aubé (Zimm. 1917, 158; *colymbus* Ganglb. 528 e Reitt. 236, ex parte; *caspius* Rég. 158, ex parte. — Raro nell'Eur. occid. e media; più diffuso nella reg. mediterr. orient., fino nel Turkestan). — Nel nostro retroterra montano, raro: Dol nel Goriziano (Schr 1); M. Maggiore in Istria, 6.20 (R 1).

565. **G. substriatus** Steph. (*natator* Ahr., nec Linné; *natator* Seidl. Tab. 115 e Zimmerm. 1917, 159; *natator* var. *substriatus*, Ganglb. 528, Reitt. 237 e Zaitzev 1908, 240. — Diffuso e com. in tutta l'Europa, nelle acque stagnanti e correnti). — Frequente anche da noi nelle conche dei torrenti, nei ruscelli, nei fossati a debole corrente, negli