

Agonum (*il sordidum*) col 3.o art. antenn. pubescente, non trovo adunque nessuna difficoltà a considerare come *Agonum* s. str. anche *P. antennarius*.

Per facilitare la determinazione delle specie del sottogenere *Agonum* s. str., che comprende anche il gruppo critico del *viduum*, ho compilato la seguente tabella dicotomica. (Per gli altri sottogenitori valgono le tabelle contenute nelle opere del Ganglbauer e del Reitter).

Subgenus AGONUM s. str.

1. Le antenne pubescenti dal quarto art. impoi, il terzo perfettamente glabro, tranne le solite setole tattili apicali. — 2.
- Già il terzo art. antenn. più o meno pubescente all'apice. (Elitre con strie punteggiate e normalmente con 3 punti impressi dorsali; le fosse basali del pronoto punteggiate). — 20.
2. Elitre verdi col margine lat. giallo; anche la base delle antenne, le zampe e le epipleure gialle. Le elitre sericee, con strie finissime ed interstrie piane; nella terza interstria tre punti dorsali, l'ultimo molto distante dall'apice; 7 - 8,5 mm. 420. *marginatum*.
— Colorito diverso. — 3.
3. Specie metalliche, colle fosse basali del protorace distintamente punteggiate e rugose; le elitre con 4 - 7 punti o fossette dorsali nella terza interstria; l'art. basale delle antenne completamente nero o metallico. — 4.
- Specie nere o metalliche; di rado più di 3 punti dorsali, in tal caso le fosse basali del pronoto liscie oppure l'articolo basale delle antenne rossiccio. — 7.
4. Gli angoli post. del pronoto piccolissimi, però marcati. Specie opaca, piatta, dapertutto distintamente zigrinata, le elitre sottilmente striate, con 4 - 7 puntini nella 3.a interstria. Colorito variabile. La f. typ. ha il corpo ant. bronzeo e le elitre verdi coi margini unicolori o leggermente cuprei; nell'ab. *austriacum* F. il colorito cupreo invade le prime 3 - 5 interstrie interne; nell'ab. (sbsp.) *dalmatinum* Dej tutta la parte sup. del corpo è uniforme, bronzea o cuprea. 9 - 9,5 mm. — Eur. media e mer., Siberia.
[*viridicupreum* Goeze.]
— Gli angoli posteriori del pronoto arrotondati. — 5.
5. Elitre con fossette dorsali maggiori, le quali hanno la larghezza della 3.a interstria. Elitre cupree, profondamente opache nella ♀, il corpo ant. lucente e spesso verdastro; le fossette elitr. sovente a fondo azzurro; 8 - 9,5 mm. — Eur. sett. e media, Siberia.
[*impressum* Panz.]
— Elitre con punti dorsali più stretti della 3.a interstria. — 6.
6. Specie maggiore, di solito distint. bicolore: il corpo ant. verde metallico, le elitre rosso-dorate. Però vi sono delle varietà di colorito meno vivace e più uniforme, con tinte bronzee, verdastre o azzurre e perfino bruno-metalliche (var. *montanum* Heer). Il pronoto con doccia lat. larga, anche le elitre più ampie; 7 - 9 mm.
419. *sexpunctatum*.