

— Specie di solito alate, colla terza e quarta stria non riunite nella fossetta dorsale anteriore ¹⁴). Occhi grandi, le tempie molto più brevi, la setola sopraorbitale post. trovasi circa al livello del margine post. degli occhi (24).

24). Elitre con due punti setigeri nel percorso della 3.a stria o almeno addossati alla medesima. (Solchi frontali paralleli, non convergenti sul clipeo) (25). — Elitre con due punti setigeri isolati nella terza *interstria* (50).

25). Corpo snello, lucente, nero-bronzato, con quattro macchie pallide sulle elitre. Le strie dorsali (tranne la suturale) molto ridotte, più o meno evanescenti verso la metà dell'elitre o ancor più accorciate; pronoto convesso, fortemente ristretto alla base, questa più stretta del collo; 3.8 - 4.5 mm: *Nepha* Motsch. ¹⁵). 125. **Genet.**

— Colorito diverso, oppure le strie oltrepassano notevolmente la metà delle elitre; pronoto di solito meno ristretto alla base (26).

26). Elitre con sette strie complete e perfettamente lisce, la 5.a sbocca nella cosiddetta «stria apicale», prolungandosi in tal modo fino all'apice. Pronoto totalmente zigrinato, la base ampia, opaca; corpo sup. olivaceo, antenne scure; il primo art. inferiormente rossiccio; 4.5 - 5 mm (*Phalaphus* Motsch. pars). [prasinum].

— Elitre con strie punteggiate ¹⁶) e almeno la settima stria più debole, accorciata o del tutto svanita: *Peryphus* Steph. (27).

27). Antenne almeno parzialmente gialle o rossicce alla base (28). — Antenne completamente nere. Corpo sup. bronzato, di rado nero o azzurro, elitre allungate, appiattite, del tutto zigrinate (♀) o soltanto all'apice (♂), con strie più o meno sottili; 3.5 - 5 mm. ¹⁷).

124. **pyrenaecum.**

28). Elitre con «stria apicale» nettamente incisa, includente il punto setigero preapicale (29). — Stria apicale evanescente o del tutto scomparsa, il punto setigero preapicale quasi o del tutto isolato. Corpo lucente, verde o azzurro, senza microscultura (46).

¹⁴). Vedi anche *B. (Limnaeum) Abeillei* Bed. Occhi, tempie e setola sopraorbitale post. circa come nel *nigropiceum*, però di statura maggiore, alato, pieco con riflessi verdastri; la 3.a e la 4.a stria non confluiscono nel punto dorsale ant. 4.2 - 4.8 mm. — Francia mer., Liguria, Corsica.

¹⁵) Vedi anche *B. (Nepha) laterale* Dej. della Reg. Tirrena e del Mediterr. occid. La macchia omerale più estesa che nel *Genet.*, essa raggiunge davanti l'orlo omerale e di dietro si avvicina alla macchia preapicale o si unisce colla medesima. Strie elitr. con punti meno grossolani.

¹⁶) Vedi anche *B. (Plataphus) Friebe* Net., con 7 strie punteggiate, complete, delle quali la 7.a si congiunge colla stria apicale; antenne perfettamente nere, corpo nero-verdastro. Specie delle Alpi orient., che è stata confusa a suo tempo col *B. virens* dell'Eur. nordica.

¹⁷) Vedi anche *B. agile* Duv. della Corsica. Statura e antenne più slanciate che nel *pyrenaecum*, occhi meno sporgenti, pronoto più stretto; corpo nero-bronzato, le tibie di solito giallo-brune.