

- allungato, il pronoto stretto, più lungo che largo, cogli orli laterali molto stretti e sottili; 5.5 - 6.5 mm. [pubens].
7. Elitre allungate, appiattite, lateralmente poco arrotondate, quasi parallele fino agli omeri; il margine apicale quasi troncato o leggermente incavato, l'angolo suturale ben marcato, quasi appuntito. Il pene con apice eccezionalmente lungo e sottile e con un pezzo interno, chitinoso, protratto in due lunghe punte sporgenti oltre la ligula bifida. Lungh. 6 mm. 185. *tolminensis*.
- Elitre oblungo-ovali, meno appiattite, più arrotondate ai lati e più ristrette verso le spalle; il margine apicale più arrotondato, l'angolo suturale ottuso o smussato. —8.
8. Le tempie quasi glabre, fortemente dilatate; pronoto con due setole marginali anteriori e le elitre soltanto con 3 punti setigeri dorsali; 5.5 - 6 mm. [temporalis].
- Le tempie con pubescenza eretta; pronoto nella metà anteriore con una setola laterale, di rado con 2 setole, in tal caso le elitre con 4 setole dorsali. —9.
9. Specie terricola d'alta montagna (Tricorno), con omeri ben marcati e prominenti ad angolo ottuso, il margine preomerale e postomerale evidentemente sinuato (quasi come nell'*A. Schaumi*); antenne e zampe meno lunghe, gli angoli post. del pronoto rettangolari; 5.3 - 6 mm. [nivalis].
- Specie cavernicole, cogli omeri più smussati o arrotondati; antenne e zampe molto esili e lunghe, di rado più brevi (nell'*hirtus istrianus*), in tal caso gli angoli post. del pronoto sporgenti, acuti. —10.
10. Il pene include un pezzo chitinoso mediano («pièce copulatrice»), coll'apice bifido, protratto in due punte triangolari; in visione laterale le due punte appaiono *piegate ad angolo* e più o meno *protratte ad uncino* in direzione ventrale ¹⁾. L'orifizio del pene con una «ligula» membranacea, arrotondata, di rado leggermente chitinizzata e incisa; 5.5 - 7 mm. 187. *hirtus*.
- Il pezzo chitinoso incluso nel pene sta nascosto tra due organi laterali, nerastri, i quali sono costituiti da un'ammasso di scaglie e spine del sacco interno; isolato per dissezione del pene, il pezzo mediano appare di forma variabile, però giammai coll'apice ripiegato ad angolo in direzione ventrale. L'orifizio del pene con una «ligula» fortemente chitinizzata, bruna, di solito incisa o smarginata all'apice; 5 - 6.5 mm. 186. *Micklitzl*.

181. *A. bohiniensis* Ganglb. (Wien-ent. Zeitg. 1903, 118, *tipo*: Monte Nero di Piedicolle; Jeannel 1926, 40; *Scopoli* sbsp., Ganglb. Wien. ent. Zeitg. 1911, 240, Winkler, Ent. Blätt. 1912, 244, Müll. 1913, 50). — Alpi Giulie: Monte Nero di Piedicolle, scoperto da Ganglbauer e Pin-

1) Si vede anche senza sezionare il pene; basta cuocerlo in una soluzione di potassa caustica ed esaminarlo poi al microscopio in una goccia di glicerina.