

anoftalmo nelle suddette località, sicchè le indicazioni del Joseph vanno giudicate colle dovute riserve.

— **A. temporalis** Müll. (Jeannel 1926, 61; *hirtus temporalis* Müll., Ent. Blätt. 1913, 302; *tipo*: Grotta Falkenhayn pr. Planina). — Il pene estremamente sottile, in visione dorsale poco più largo dell'apice; la ligula membranacea, biancastra, il pezzo mediano allungato, bifido, con due punte ricurve ad uncino in direzione ventrale. — Trovasi nel territorio di Planina, nella zona slovena di confine: Grotta Falkenhayn (Gmajnska jama) presso Laze, ove è stato scoperto nel 1913 dal defunto A. Haucke, esponendo bicchieri con esca nell'ultima grande caverna, in V e XI, raro; Mačkočka jama (o Mačkovica) presso Laze, 8 e 9.920 (R 5).

— **A. pubens** Bedel (Ann. Soc. ent. France, Bull. 125, nom. nov.; Ganglb. 210, Müll. 1913, 64 e Jeannel 1926, 60; *pubescens* Joseph, Berl. ent. Zeitschr. 1870, 268, *tipi*: Mrzla jama sulla Križna gora (Kreuzberg) presso Lož (Laas) e Grotta di Planina). — Trovasi nella zona slovena di confine: Mačkovca jama pr. Laze, dint. Planina (Gspan, in primavera); Grotta Falkenhayn pr. Planina (Haucke e Gspan); Grotta di Zavrh pr. Borovnica 4 e 5.18 (Staudacher e Springer).

Nota. — Basandomi sulla mancanza assoluta di ambo le setole protoracali credetti di dover istituire per l'*An. pubens* il sottogenere *Haplotrechus* (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, 1917, 614). Mi associo ora a JEANNEL (1926, 60), nel considerare il *pubens* come un vero *Anophthalmus*, prossimo affine dell'*hirtus spectabilis*, col quale condivide la forma del pene e del pezzo mediano interno. La riduzione delle setole è un carattere neogenetico di poca importanza. Lo dimostrano le setole del capo (sopraorbitali), le quali appunto nel *pubens* sono tuttora soggette alla *variabilità individuale*, essendo talvolta perfettamente sviluppate, talvolta del tutto assenti (vedi Wien. ent. Zeitg. 1921, 98); mentre le setole del pronoto hanno già raggiunto una fase di stabilità, dirò così negativa, perchè mancano affatto in tutti gli es. finora conosciuti.

Gen. *Orotrechus* Müll., Jeann.

Comprende finora 9 specie, distribuite principalmente lungo il margine merid. delle Alpi orientali, dal Vicentino fino alla Conca di Lubiana. Le due specie della V. G. si possono distinguere nel modo seguente:

1. Elitre meno globose, con microscultura a maglie trasversali. Pronoto con minutissima setola negli angoli post., addome con due soli punti setigeri dinanzi al marg. post. dei singoli sterniti; 3.8 - 4.2 mm. 189. *longicornis*.
- Elitre più globose, con microscultura più grossolana, a maglie polygonali, quasi isodiametrichie. Pronoto senza setola negli angoli post., addome con 4 - 6 puntini setigeri lungo il marg. post. dei singoli sterniti; 3.8 - 4.3 mm. 190. *Müllerianus*.