

diffuso lungo le nostre coste, su terreno melmoso o sabbioso, II - XI. — Friuli: Lagune di Grado, com.; Belvedere e spiaggia di Bestrigna. — Trieste e Istria: S. Sabba, Zaule, Noghera, Capodistria e Pola; dint. Fiume (*Pad.* 113).

Nota. — Il *P. chalceus* dell'elenco dei coleotteri della Valle d'Ospo (*Schatzmayr* 1912), è evidentemente il *litoralis*. Il vero *chalceus* non mi consta nemmeno dalla Dalmazia; esso trovasi però in Germania.

194. **P. riparius** Dej. (Spec. III, 16, *tipi*: Francia mer. e Dalmazia; Ganglb. 223, Reitt. Tab. 12 e Barthe, Misc. Ent. XXVI, 450. — Coste europee del Mediterraneo). — Egualmente diffuso lungo le nostre coste, su terreno melmoso, salmastro; trovasi di solito sotto sassi, II - IX. — Friuli: Lagune di Grado; Belvedere, spiaggia di Bestrigna, Is. Morosini. — Istria: Zaule, Noghera, Valle d'Oltra, Capodistria, Foce del Quieto, Pola, Fianona; Is. Arbe, nelle saline di S. Eufemia.

P. (POGONIDIUS) MERIDIONALIS Dej. — E' stato segnalato da Trieste (leg. Dahl, in coll. Heyden; cf. *Apfb.* 150). Questa indicazione va registrata colle dovute riserve, non essendo stato raccolto più tardi il *P. meridionalis* in nessun punto delle coste adriatiche.

195. **P. (Eupogonistes) gracilis** Dej. (Spec. III, 18, *tipi*: Francia mer. e Trieste; Ganglb. 223, Reitt. Tab. 5, Bed. N. Afr. 88 e Barthe, Misc. Ent. XXVI, 452. — Reg. Mediterr. e Coste Atlantiche della Francia). — Da noi finora soltanto nelle saline dell'Istria sett.: Noghera, 5, 6 e 7.911 (Pr, Spr); Capodistria 4.09 e 5.910, plur. — Is. Arbe, saline di S. Eufemia, 4.08 e 9.910 (May).

Gen. *Patrobus* Steph.

196. **P. excavatus** Payk. (Ganglb. 226, Reitt. 133, Barthe, Misc. Ent. XXVI, 455; *meridionalis* Müll. Wien. ent. Zeitg. 1911, 58, *tipi*: Friuli, Trentino. — Eur. sett. e media). — Raggiunge nella pianura friulana il limite meridionale: Is. Morosini 4.09 (Me May, 2 es.). — Il *Pade-wieth* (1907, 113) lo indica anche pei dint. di Fiume.

Nota. — Dei due es. dell'Isola Morosini uno solo possiede la base del pronoto alquanto più stretta di quelli dell'Eur. media, nell'altro es. la differenza è meno evidente. Io credo perciò di non poter più mantenere la mia sbsp. *meridionalis*, istituita appunto per gli es. dell'Is. Morosini, come razza ben distinta.

Perigoninae.

Gen. *Perigona* Cast.

197. **P. nigriceps** Dej. (Spec. V, 44, *tipo*: America del Nord; Ganglb. 228. — Specie cosmopolita di origine esotica; è stata più volte importata in Europa coi battelli e sembra acclimatizzarsi in vari punti della reg. mediterranea). — E' stata segnalata da Trieste (Ganglb. 228); io ho veduto alcuni es. trovati a Aidussina (Bianchi). — Da una nota di *Fleischer* (*Časopis* 1922, 18) si rileva la cattura di questa specie in un parco presso Teschen (Slesia), ove venne probabilmente importata con piante spedite da Trieste.