

- Il disco del pronoto più o meno punteggiato anche nel mezzo, la punteggiatura si estende sempre lungo tutto il margine ant. La parte sup. del corpo di rado metallica (ab. *festivus* Dan.), più spesso bruna; 9 - 12 mm. — Russia mer., Caucaso. [Steveni Dej.]
31. Elitre col solito punto impresso nella metà apicale della 3.a interstria, adossato alla 2.a stria dorsale. — 32.  
— Elitre senza alcun punto nella 3.a interstria. — 81.
32. Le tibie ant. inferiormente con una fila di setole del tutto indipendente e staccata dalle spine apicali esterne <sup>11)</sup>. l'angolo apicale esterno delle tibie ant. semplice. — 33.  
— Le tibie ant. inferiormente con una fila di setole, la quale, alquanto prima dell'apice volge all'esterno e si unisce colla serie di spine apicali esterne; l'angolo apicale esterno talvolta protratto a lobo. — 85.
33. Il pronoto nella metà ant. con più punti setigeri laterali. La punteggiatura del pronoto molto estesa e più o meno distinta anche sul disco. — 34.  
— Il pronoto nella metà ant. con un solo punto setigero laterale; la punteggiatura della base non si estende mai fino al centro del disco. — 36.

Subgen. *Artabas* Gozis.

34. Almeno le interstrie esterne delle elitre punteggiate e gli angoli post. del pronoto arrotondati. Il ♂ lucente, con elitre azzurre o verdi, la punteggiatura piuttosto rada e limitata alle interstrie esterne. La ♀ con elitre opache, quasi totalmente punteggiate e coll'angolo suturale appuntito, sporgente. L. 9 - 11 mm. — Francia meridionale, Liguria, Macedonia. [dispar Dej.]  
— Tutte le interstrie perfettamente lisce; gli angoli post. del pronoto retti o ottusi. — 35.
35. Pronoto con pubescenza eretta, i lati semplicemente ristretti all'indietro e gli angoli post. ottusi, leggermente smussati all'apice. Specie più grande e più robusta. Le zampe nerastre, eccezionalmente rosse. L. 10 - 12 mm. 247. *Stierlini* Poncy.  
— Pronoto senza pubescenza eretta, i lati leggermente sinuati dinanzi alla base e gli angoli post. acuminati. Specie più piccola; zampe nere, eccezionalmente rosse. L. 8 - 11 mm. — Specie mediterr. (anche in Italia e in Dalmazia). [punctatostriatus Dej.]

Subgen. *Harpalus* Latr. s. str.

36. Almeno le interstrie esterne delle elitre densamente punteggiate e pubescenti (*Epiharpalus* Reitt.). — 37.  
— Tutte le interstrie glabre, non pubescenti. — 40.

<sup>11)</sup> L'unica specie, nella quale si potrebbe essere in dubbio circa il decorso delle setole sulla faccia inf. delle tibie, è l'*H. melancholicus*. Esso si distingue però facilmente dalle specie contemplate al n. 85 per la presenza di puntini apicali nell'ottava interstria.