

Tabella per la determinazione delle specie :

(Europa media, Italia, Balcania).

1. Specie alate; elitre azzurre, verdastre, violacee oppure parzialmente gialle, solo eccez. picee; omeri sporgenti. — 2.
— Specie attere; elitre nere o brune, omeri più arrotondati. — 15.
2. Subg. *Brachynus* s. str. — Insetto giallo-rossiccio, soltanto le elitre con disegno nero, composto di un lembo suturale che occupa le prime 3 o 4 interstrie e di una macchia preapicale; interstrie costale; 9-10 mm. — Mediterr. occ. [*humeralis* Ahr.]
— Elitre azzurre o verdi, con 2 o 4 macchie gialle isolate. — 3.
— Elitre senza macchie isolate, tutt'al più parzialmente rossicce alla sutura nella regione scutellare. — 5.
3. Specie maggiore; le elitre costate, quasi nude, con una macchia gialla, rotonda, nella metà post., l'orlo apicale membranaceo molto largo; 8-11 mm. — Mediterr. orientale. [*Bayardi* Dej.]
— Statura minore, elitre lievemente striate, pubescenti. — 4.
4. Elitre soltanto con una macchia trasversale nella metà post., di rado prolungata verso la spalle (var. *Engel Reitt.*); il terzo e il quarto art. antenn. neri; 5-6,5 mm. — Balcania, Asia minore. [*bipustulatus* Quens.]
— Elitre con due macchie laterali gialle, una dietro la base ed una verso l'apice; talvolta con una piccola macchia accessoria alla sutura verso l'apice (ab. *caspicus* Dej.); il terzo e quarto art. antenn. di solito più o meno anneriti; 3,5-5 mm. — Reg. Mediterr. [*exhalans* Rossi].
5. Il margine apicale delle elitre provvisto di una serie di setole molto evidenti e poco dense. — 6.
— Il margine apicale delle elitre glabro, oppure con brevissimi e densissimi peli gialli, appena visibili con forte lente. — 10.
6. Elitre con una macchia triangolare, allungata, rossiccia, nella reg. scutellare. Tutta la parte infer. e le antenne giallo-rossicce; elitre opache, distint. striate; 7-9 mm. 478. *plagiatus*.
— Elitre unicolori, senza triangolo scutellare rosso. — 7.
7. Tutta la parte inf. e le antenne giallo-rossicce; il pene con una sporgenza preapicale; elitre debolmente striate. — 8.
— Almeno l'addome nerastro; il pene semplice. — 9.
8. Statura in media maggiore e più tozza. Il pene, visto di sopra, con un rigonfiamento laterale all'altezza dell'orifizio, l'apice largo e lievemente inciso nel mezzo; visto di fianco, con un forte uncino preapicale; 6,5-9 mm. 479. *Ganglbaueri*.
— Statura in media minore e più allungata. Il pene, visto di sopra, ha l'aspetto di un semplice ed esile tubo arrotondato all'apice, senza rigonfiamento laterale; visto di fianco, con piccolissima sporgenza dentiforme preapicale; 6-8 mm. 480. *psophia*.
9. Elitre di solito leggermente striate, con orlo membranaceo apicale molto stretto e fornito di cilia più lunghe. Nella *f. typ.* il 3. e 4. art. antenn. più o meno anneriti, nella ab. *annulatus* Rtt. anche