

Pterostichini.

Gen. *Pterostichus* Bonelli ¹⁾.

349. **Pt. (Poecilus) Koyi** Germ. (Ins. Spec. nov. 1824, 16, *tipi*: Illiria, Dalmazia; Schaum 446, Chaud. l' Abeille 1876, 10, Bed. 100; *Feronia viatica* Dej. III, 216; *Pt. Koyi* + *marginalis* Ganglb. 268 e Reitt. 146. — La specie, considerata nel senso attuale, vasto, comprende due sottospecie vicarianti: il *marginalis* della Siberia e dell'Eur. orientale, che si estende a occidente fino a Vienna; e il *Koyi* s. str. dei paesi carsici, dell'Italia sett. e della Francia. A quest'ultimo appartengono naturalmente gli es. della V. G., i quali, per le variazioni morfologiche e cromatiche cui vanno soggetti, si possono suddividere in due o tre forme minori:

a) *Koyi goricianus* Müll. (Wien. ent. Zeitg. 1921, 136, *tipo*: Tarnova). — Forma montana della parte settentrionale della V. G. Corpo nero; uno o due articoli antenn. rossastri. Le strie elitr. debolmente punteggiate, anche la punteggiatura alla base del pronoto più o meno ridotta. — Monti del Goriziano e dell'Istria, nella reg. aprica attorno le vette, sotto i sassi: M. Juanez pr. Cividale, Matajur, Selva Tarnova, Monte Re, Auremiano, Castellaro, Taiano e M. Maggiore; V-IX. — Località più basse, sotto i 700 m: Senosecchia, Val Branizza, S. Daniele, Creple, Roditti e Berje nel retroterra di Trieste; nei dintorni più prossimi della città a Trebiciano, S. Croce, Opcina, Conconello fin giù al Cacciatore; in Istria presso Cosina, nella Grotta di Tublje, a Poljane pr. Castelnuovo e Laurana alla costa liburnica; nel Goriziano presso Volzano ed anche alla spiaggia di Bestrigna pr. Monfalcone; IV-IX.

b) *Koyi lossinianus* Fairm. (*Pt. lossinianus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1859, 216, *tipo*: Lussin). — Forma litorale dell'Istria e del Carnaro. Corpo nero, talvolta il primo art. antenn. parzialmente rossastro. Le strie elitr. più fortemente punteggiate e distintamente crenulate. Rassomiglia per grandezza e scultura alla f. typ. dei dintorni di Zara, ne differisce soltanto per la mancanza di riflessi azzurri o verdastri sulla parte sup. del corpo. — Nel Carso di Salvore, sotto i sassi, plur.; Rovigno, pr. il Palù; Pola (Schletterer); Fiume (Krauss); Cherso (R 10); Lussin, raro (Galv e Sch); Canidole piccola, plur. (Galv e Sch); Unie (Sch); quasi tutti gli es. in III-V. — Non ho presentemente gli es. di Brioni (Pa) e Veglia (Net), i quali dovrebbero, probabilmente, appartenere a questa razza.

1) Indicazioni erronee o inesatte:

- Il *Carabus lepidus* di Trieste e Zara (Germar, Reise Dalm. 196) = *Koyi* Germ.
- Il *Poecilus marginalis* del M. Maggiore (P. Meyer 1912, 83) = *Koyi goricianus*.
- Il *Pterost. vulgaris* dell'elenco del Depoli (1913, 50) è il *melas*.
- La *Feronia placida* del Nevoso e Crna prst (Mill 1879, 465) è il *Pter. Schmidtii*.
- Il *Pter. subsinuatus* dei dint. di Fiume (Pad. 113) è certamente l'*unctulatus*.
- Il *Pter. hungaricus* di Gorizia (Schreib. 1885, 265) = *melas*.
- Il *Pter. fossulatus* v. *Welensi* di Fuzine e Ljeskovac (Kuthy 34) = *variolatus*.

Indicazione incerta: *Pter. inaequalis* Marsh., di Fiume (Pad. 113).