

La ab. *nigripes* Dej. trovasi a Trieste e in Istria promiscua colla f. typ. Da Gorizia al nord non conosco finora che la f. typ. — Un'esemplare intermedio fra la f. typ. e la ab. *nigripes* è stato catturato tra Cosina e Matteria in Istria (Pr). Le zampe post. completamente nere, nelle ant. e intermedie i femori parzialmente rossi, le tibie nere.

— L. *trimaeculata* Villers (Reg. Mediterr.; in Francia al nord fino alla Senna, in Ungheria fino a Budapest). — Esiste nella coll. Hoffmann come proveniente dai dint. di Fiume (Dep. 1913, 52). Sarà bene attendere ulteriori catture per accertare la località. — Io l'ho raccolta in Dalmazia, al nord fin Zara.

441. **L. marginata** Geoffr. (Bed. 117, Ganglb. 400, Reitt. 192; *haemorrhoidalis* Fabr., Dej. I, 266 e Schaum 291. — Eur. media, spec. nella parte occidentale e merid.; al sud fino in Serbia, Bosnia, Italia mer., Portogallo). — Da noi finora soltanto nel Goriziano: Volzano, sotto un tronco abbattuto nel bosco, 7.08 (Ku 1); Pervacina 5.912 (Spr 1); Aidussina (Bianchi).

442. **L. scapularis** Geoffr. (Bed. Col. Seine 117 e N. Afr. 246., Gglb. 400 e Reitt. 191; *turcica* Fabr., Dej. I, 263 e Schaum 290. — Mediterr. e parte mer. dell' Eur. media). — Da noi in Friuli, nella parte merid. del Goriziano, a Trieste e in Istria, sugli olmi, ove dà la caccia alle larve della *Galerucella xanthomelaena*, in V-VII, generalmente rara; più com. in Dalmazia. — Carnia: Tolmezzo (*Gortani* 62). — Goriziano e Friuli: Doberdo, Aidussina, Scodovacca e Borgnano (Schr); Monfalcone (Cz) e Belvedere (Bernh. Pa). — Trieste: S. Sabba (Cz., Str. div.); sull' altipiano tra Conconello e Banne (R), a Lipizza (Sch) e Bivio (M), sing. — Istria: Pola (Steinh.), Albona (Cir), Fianona e Chersano (*Stuss*. 92). — Fiume (coll. Hoffmann, Dep. 1913, 52). — Isole: Veglia (Schr 1).

Tutti gli es. della V. G. che ho visto finora, hanno la colorazione della f. typ. Appena più al sud, in Dalmazia, trovansi anche singoli es. della ab. *quadrinaculata* Dej.

D omiini.

Gen. *Demetrias* Bonelli.

443. **D. (Demetrias s. str.) monostigma** Sam. (Bed. 119, Ganglb. 410, Reitt. 196 e Müll., Wien ent. Zeitg. 1921, 141; *unipunctatus* Germ., Dej. I, 230 e Schaum 262. — Eur. sett. e media, Asia occid.). — In siti paludosi delle pianure alluvionali, dalla fine III-VI. — Friuli: Monfalcone, alla spiaggia oltre Bestrigna, piuttosto raro; Is. Morosini, dis. — Istria: Val Quieto inf. (Sch 9).

444. **D. atricapillus** L. (Bed. Col. Seine 119 e N. Afr. 269, Schaum 262, Ganglb. 410 e Reitt. 196; *atricapillus* + *elongatulus* Dej. I, 231 e 232. — Eur., Mediterr.). — Friuli: tra Villa Vicentina e Aquileia, falciando le erbe lungo i fossati, 6.04, div. (M); Monfalcone 4.27 (Pr 1); Is. Morosini 4.09 (Kr 2). — Trieste e Istria: Cossana pr. S. Pietro del Carso, 10.26 (Kodric 1); Pola (teste Web. 2). — Il colorito è quello della f. typ., cioè il capo nero.

445. **D. (Aetophorus) imperialis** Germ. (Schaum 259, Bed. Col. Seine 120 e N. Afr. 269, Ganglb. 409 e Reitt. 196. — La f. typ. dell' Eur. media è sostituita da noi dalla seguente razza meridionale: