

— Nero, senza riflessi metallici. Elitre meno convesse e meno acute all'apice; il secondo punto dorsale trovasi in mezzo della terza interstria oppure addossato alla 3.a stria dorsale, il terzo punto è meno discosto dall'apice; 7,5 - 8,5 mm. 427. **moestum**.

20. Elitre con impressione preapicale nella 5.a stria. Il corpo ant. nero o leggermente bronzeo, il pronoto ai lati (o anche alla base) con orlo rossiccio; le *elitre brune* o *rossiccie*, del tutto o almeno verso il margine lat.; anche i femori e le elitre di colore chiaro, giallognolo o bruno; 8 - 9,5 mm. 429. **sordidum**.

— Elitre senza impressione preapicale. Tutto il corpo, comprese le elitre, di color nero con riflesso azzurro o verde scuro; soltanto le tibie rossiccie; 6 - 7,5 mm. 430. **antennarium**.

418. **A. (Agonodromius) quadripunctatum** De Geer (Dej. Spec. III, 170, Schaum 411, Ganglb. 255, Reitt. 139 e Reitt. 1907, 63 — Eur. sett., Siberia e montagne dell'Eur. media). — Alpi Giulie: Nevea 7.22 (Sch 1); Porezen, nel bosco, in un sito umido cosparsa di legni carbonizzati, 6.24 (Spr 7).

Gli es. del Porezen hanno, come di solito, 4 fossette impresse nella terza interstria, di rado una di più o una di meno su una elitra. L'es. di Nevea possiede eccez. un numero maggiore di fossette elitrali: 5 da ogni lato nella terza interstria ed oltre a ciò 2 - 4 fossette nella quinta interstria, che ne è normalmente priva.

419. **A. (Agonum s. str.) sexpunctatum** L. (Dej. III, 140, Schaum 414, Ganglb. 255, Reitt. 140 e Reitt. 1907, 65. — Eur. sett. e media, Siberia). — Esclus. nel retroterra montano al nord del Vipacco e a est del Timavo sup. Vive spec. nella zona dei faggi, nelle radure dei boschi, sotto i sassi e i detriti vegetali, però anche nella regione aprica delle vette (Mataiur); scende nel Goriziano fin giù all'Isonzo (Volzano), ove vive nel muschio alla base dei salici; V - VIII. — Carnia: reg. montana da Tolmezzo in su (Gortani 60); Villa Santina (Vallon), M. Flop (R). — Tarvisiano: Fusine Laghi. — Goriziano: Tricorno (Val Vrata). Porezen, M. Razor di Tolmino, Plezzo, Volzano, Mataiur, Tarnova e Monte Re. — Retroterra di Fiume: M. Nevoso; Vrata in Croazia (Dep). — Anche al Lago di Zirknitz in Carniola (Meixner).

I nostri es. appartengono in gran parte alla f. typ., colle elitre di un rosso-dorato vivace. Es. più piccoli, con tinte più scure e sbiadite, mi constano dal M. Razor, Monte Re e dalla Val Vrata in Croazia.

— **A. viridicupreum** Goeze. — E' stato segnalato dal territorio di Fiume (Pad. 113), ove potrebbe trovarsi nel retroterra montano. — Al Lago di Zirknitz, al nord del Nevoso, è stata raccolta la f. typ. insieme colle varietà *austriacum* e *dalmatinum*, 6.910 (Meixner).

420. **A. marginatum** L. (Dej. Spec. III, 133, Schaum 412, Gglb. 257, Reitt. 140 e Reitt. 1907, 67. — Eur. e Mediterr.) — Trovasi da noi in poche località, sparse dalla reg. mediterranea (Pola) fino all'alpina (Lago di Raibl), alle sponde dei laghi e degli stagni. — Zona di Tarvisio e Gorizia: Lago di Raibl 7.05, div. (Sch); Altipiano di Bainsizza,