

94. **B. (Principidium) punctulatum** Drap. (Schaum 680, Ganglb. 157, Reitt. 107, Müll. 109. — Eur. media e merid., Asia min.). — Nelle ghiaie lungo i fiumi e i torrenti del Goriziano e dell'Istria sett., talvolta com., IV-X; eccezionalmente presso le acque stagnanti. — Goriziano e Friuli: all'Isonzo presso Volzano, Boschinis, Sagrado, Pieris e Is. Morosini; al Iudrio; nella Val Vipacco presso Aidussina e S. Vito; al Lago di Doberdo (Cz). — Istria sett.-or.: al torrente Recca tra Ospò e Noghera (Cz 1); al Risano (Ch 4). — Dint. Fiume (*Pad.* 113).

85. **B. (Testedium) bipunctatum** L. (Schaum 714, Ganglb. 158, Reitt. 107, Müll. 110. — Eur. sett. e montagne dell'Eur. media e merid.). — Da noi la subsp. **nivale** Heer, delle Alpi, dei Carpazi e dei Balcani; nella zona alpina sotto sassi. — Alpi Giulie: Mangart, 7.21 e 7.24, es. bronzei e neri (Ch, plur.); M. Nero di Piedicolle, 6.08 (Ku 2); M. Nero di Tolmino (Schr 1). — In Carnia nella reg. subalpina e alpina: Cas. Collinetta di Sopra (1700 m), M. Tragonia (1900 m) e M. Clapsavon (1800-1950 m) (*Gortani* 60).

96. **B. (Notaphus) dentellum** Thunbg. (Ganglb. 158, Reitt. 108, Müll. 59; *flammatum* Clairv., Schaum 683. — Eur. media e sett., Siberia occ.). — Friuli: Is. Morosini, su terreno melmoso alle sponde di un ramo morto dell'Isonzo, IV e V, div. es. — Carniola: Lago di Zirknitz, 3.6.910 (*Meixner*). — L'indicazione del *Pad.* (1907, 113), relativa alla presenza di questa specie nel territorio di Fiume, va controllata.

97. **B. varium** Oliv. (Schaum 684, Ganglb. 159, Reitt. 108, Müll. 60. — Reg. palearct.). — Da noi piuttosto raro e localizzato, in siti paludosi e su terreno salmastro. — Goriziano: Borgnano pr. Cormons, 3.20 (Ch 3); nelle lagune di Grado, 7.05 (Pa 1); Lago di Doberdo, 4.05 (M 1). — Istria: Noghera, al mare (Gr 2, sec. *Schatz.* Ospò, 147); Valle del Quietò inf., 5.23 (R e Sch 4); Porto di Fianona, su terreno melmoso, salmastro, 5.04 (M 1); dint. Fiume (*Pad.* 113). — Anche in Carniola al Lago di Zirknitz (*Meixner*).

98. **B. semipunctatum** Donovan. (*adustum* Schaum 686, Ganglb. 159, Reitt. 108, Müll. 60. — Eur., Siberia). — Finora soltanto in Friuli: Is. Morosini, 5.08 e 5.14 (May 2). — L'indicazione del *Pad.* (1907, 113), relativa ai dint. di Fiume, va controllata.

99. **B. (Notaphemphanes) ephippium** Marsh. (Schaum 687, Ganglb. 160, Müll. 59; *Netolitzky*, Col. Rundschau 1920, 96. — Coste dell'Atlantico e del Mediterraneo; anche in Ungheria e Rumenia, su terreno salinifero). — In pochi punti della zona litorale, su terreno melmoso vicino al mare: Grado, nelle lagune, 7.05 (Pa 2; ivi anche Bernh); Capodistria, nelle saline, es. erranti sul suolo, 4 e 5.09 (Gabr); Monfalcone, alla spiaggia, 6.22 (Sch 1); Is. Arbe, 9.910 (Kr).

B. (PLATAPHUS) PRASINUM Duft. (Schaum 682 Ganglb. 160, Reitt. 109, Müll. 71. — Eur. media mont., Eur. sett., Siberia). — Trovasi nella Bochinia, vicino al nostro confine sett.: presso la cascata della Savizza, com., 8.911 (Pr). Esempari di questa località anche al Museo di Vienna (*Schuster*); vedi anche *Netolitzky* (Ent. Blätt. 1913, Verbreitungskarte).