

Nota. — Osservo che le tibie ant. del ♂ sono incavate al margine interno verso la base. Le elitre dei nostri es. sono brune, con linee longitudinali poco evidenti, sbiadate, mentre gli esemplari della Germania dovrebbero avere le elitre più distintamente lineate.

Gen. *Deronectes* (Sharp) Zimm.

Nota. — ZIMMERMANN (Arch. Natg. 1919, 183) arrotonda il genere *Deronectes*, includendovi gli *Hydroporus* del gruppo *Oreodytes* Seidl., nonché l'*H. halensis*, che viene giustamente a far parte del gruppo *Oreodytes*. Il genere *Deronectes*, così ampliato, può suddividersi nei seguenti sottogeneri:

1. Le lamelle interne delle anche post. divise all'apice in due lobi divaricati, tra i quali si interpone nel mezzo una piccola sporgenza comune, acuminata. — 2.
— Le lamelle interne delle anche post. divise all'apice semplicemente in due lobi divaricati, senza sporgenza mediana. — 3.
2. Il processo prosternale più stretto, appuntito all'apice e carenato nel mezzo. I tarsi post. esili, lisci, tutt'al più la parte sup. del primo art. con minutiss. punteggiatura microscopica. Il pene ed i parameri simmetrici. Specie unicolori, opache, nere o rossobrune, senza disegni gialli. Subg. *Deronectes* i. sp.
— Il processo prosternale largo, meno appuntito, senza carena mediana. I tarsi post. più robusti e in gran parte coperti di sottilissima punteggiatura, come pure le tibie ed i femori. Il pene ed i paramenti più o meno asimmetrici. Il corpo superiormente nero con disegni gialli. Subg. *Stictotarsus* Zimm.
3. La parte inf. del corpo opaca o poco lucente, con sottile e fitta punteggiatura microscopica. I femori post. densamente punteggiati; il pronoto senza impressione trasversale alla base. (*Potamodytes* Zimmermann 1919). Subg. *Potamonectes* Zimm. 1921.
— La parte inf. del corpo zigrinata, con punteggiatura sparsa; oppure fortemente punteggiata, cogli intervalli perfettamente lisci, lucenti. I femori post. soltanto con radi punti setigeri; il pronoto di solito distint. impresso alla base Subg. *Oreodytes* (Seidl.)

531. **D. (*Deronectes* s. str.) *latus*** Steph. (Schaum - Kiesw. 49, Seidl. Tab. 50, Ganglb. 460 e Reitt. 212. — Eur. media). — Istria settentrionale: tra i muschi nell'acqua corrente della Rosandra, presso Zaule, Vallone di Muggia, 5.910 (Pr 6) e 21.3.20 (M, plur.).

532. **D. (*Potamonectes*) *luctuosus*** Aubé (Seidlitz Tab. 55, Ganglb. 462. — Francia mer., Italia, Balcania, Asia min.). — Goriziano: nel fiume Isonzo presso Volzano, 7.08 (Ku) e Gorizia, quivi in certi siti abbastanza frequente (*Schreib.* 1885, 266). Assieme al tipo normalmente macchiato trovansi anche es. nei quali mancano quasi tutte le macchie delle elitre (ab. *sericeus* Costa). — Dint. Fiume (*Pad.* 114).