

Gen. *Haliplus* Latr.

Oss. — Credo di fare cosa utile ai colleghi d'Italia dando qui appresso un riassunto della tabella dello ZIMMERMANN (Ent. Blätt. 1924). In alcuni punti vi ho sostituito i caratteri distintivi con altri, più evidenti e precisi. Vi ho incluso, oltre alle specie della Venezia Giulia, anche tutte le altre osservate in Italia, in Balcania e nell'Europa media.

1. Tutto il corpo, di sopra e di sotto, con minutissimi, ma densi puntini, che rendono la superficie più o meno opaca; elitre con file di punti relativamente sottili. — 2.
- Corpo lucente, tutt' al più le elitre della ♀ in alcune specie con punteggiatura quasi microscopica; le strie delle elitre con punti più grossolani. — 4.
2. La parte mediana del prosterno con due orli rialzati e tramezzo con punteggiatura sottile. Pronoto d' ambo i lati con breve stria basale, elitre con linee longitudinali scure, più o meno interrotte all' esterno. Nella var. *pallens* Fowl. della Germania sett. le linee scure sono molto ridotte o mancano quasi affatto. L. 3.5 mm. — Europa media, Siberia. [confinis Steph.]
- La parte mediana del prosterno non orlata. — 3.
3. Lung. 3 - 3.7 mm; pronoto giallo, tutt' al più al margine ant. con orlo scuro; prosterno con punteggiatura grossolana. Elitre con linee nere interrotte in modo da formare un disegno a macchie; nella sbsp. *albinus* Rtt. del Lago di Costanza quasi totalmente giallo-bianchiccie, colla sutura nera. 488. *obliquus*.
- Lung. al massimo 3 mm; pronoto con orlo nero ben marcato e largo al margine ant. e post.; anche l' estremo margine apicale dei femori nerastro; prosterno con punteggiatura meno grossolana; elitre con linee nere, le esterne interrotte in due punti. — Eur. settentrionale e occidentale. [varius Nicolai].
4. Pronoto con due strie basali nettamente incise. — 5.
- Pronoto senza strie basali. — 13.
5. Le strie basali profonde, ricurve e prolungate circa fino alla metà del pronoto, la base con depressione trasversale. Pronoto giallo, di solito con linea longitudinale scura nel mezzo; 2.2 - 3 mm. 489. *lineatocollis*.
- Le strie basali più brevi, oblique, diritte o poco ricurve; pronoto senza linea scura nel mezzo e di solito anche senza depressione trasversale alla base. — 6.
6. La parte anteriore mediana del metasterno (processo intercoxale) con due fossette allungate, simmetriche, una per parte. — 7.
- La parte ant. del metasterno piana e infossata nel mezzo. — 8.
7. La parte mediana del prosterno più o meno convessa, non orlata, con punteggiatura scarsa e sottile; elitre di solito con macchie brune nella metà apicale, senza punteggiatura microscopica nella ♀; 2.6 - 3 mm. — Eur. sett. e media. [fulvicollis Er.]