

che convenga allontanare il *laticollis* dal II.o gruppo dello Spaeth, ponendolo nel I.o gruppo, e allora si avranno tre gruppi realmente omogenei e naturali, che si possono definire nel modo seguente:

**I. Gruppo.** — Le strie delle elitre gradatamente attenuate verso il margine esterno, sicchè non avvi grande differenza di sviluppo tra la 7.a e l'8.a stria. Le interstrie 3-7 generalmente più larghe, la 7.a supera in larghezza lo spessore delle strie adiacenti. La base delle elitre presenta nella regione scutellare due file di punti oblique, una che costituisce la continuazione della stria suturale, ed un'altra accessoria. La 2.a interstria di solito non supera in larghezza la 3.a e la 4.a riunite. Il capo con 6 pieghe frontali ben marcate. — *N. pusillus*, *aquaticus*, *palustris*, *hypocrita*, *laticollis* e probabilmente le specie a me ignote *sublaevis*, *interstitialis* e *impressifrons*.

**II. Gruppo.** — Le strie delle elitre sottili, gradatamente attenuate all'esterno e la 7.a interstria evidentemente più larga delle strie adiacenti; però la fronte con 8 o più pieghe, meno forti e meno regolari che nel gruppo antecedente. La 2.a interstria raggiunge in larghezza le 3 prossime riunite. Alla base delle elitre nella regione scutellare vi sono dei punti più o meno distintamente allineati in tre brevi file oblique. — *N. substriatus*, *Danieli*, *marginatus* e *geminatus*.

**III. Gruppo.** — La 2.a fin 7.a stria fortemente incise, a punteggiatura egualmente forte e densa in tutta la loro estensione; l'8.a invece molto più debole e sottile, salvo nel tratto basale. La 7.a interstria non supera lo spessore delle strie adiacenti, l'8.a invece larghissima; la 2.a interstria raggiunge in larghezza le tre prossime riunite. Alla base delle elitre 3 brevi file di punti grossolani, allineati obliquamente (compreso il tratto basale della linea suturale). — *N. rufipes*, *quadripunctatus*, *biguttatus* e probabilmente le specie a me ignote *Hauseri* e *Reitteri*.

\*  
\*\*

Per la determinazione servirà però meglio la seguente *tabella dicotomica*, la quale, prescindendo dal raggruppamento naturale, non tende ad altro che a facilitare la distinzione delle nostre specie:

1). Elitre con un solo punto ombelicato preapicale, totalmente metalliche, non zigrinate; zampe nere: **aquaticus** L. — Con due punti preapicali (2).

2). Femori totalmente neri, a riflessi metallici (3). — Femori anteriori o anche gli intermedii parzialmente giallognoli verso l'apice (8).

3). Le strie delle elitre gradatamente attenuate all'esterno, sicchè non vi è grande differenza di sviluppo tra la 7.a e l'8.a stria. La 7.a interstria supera in larghezza le strie che la delimitano (4). — La 2.a fin 7.a stria egualmente forti e marcate, l'8.a invece molto più sottile ed evanescente, salvo nel tratto basale. La 7.a interstria non più larga delle strie adiacenti (9).