

10. Specie dell' Eur. media; il rivestimento interno del pene semplicemente granuloso, senza sporgenze chitinee maggiori; l'apice del pene relat. snello e rivolto all'inghiù. 460. *minutulus*.

— Specie mediterranea; il sacco interno del pene con 8-10 uncini spiniformi, l'apice del pene breve, non rivolto all'inghiù; le tibie intermedie del ♂ abbastanza curve. [*negrita* Woll.]

— Specie mediterranea; il sacco interno del pene con dentini spiniformi disposti in 3 gruppi, l'apice del pene lungo e curvato in direzione ventrale; le tibie intermedie del ♂ assai debolmente incavate nella metà apicale interna. [*Seladon* Holdh.]

459. *M. luctuosus* Holdh. (1912, 489; *exilis luctuosus* Holdh. in Apfb. 330; *maurus* Ganglb. 404, ex parte; *nigrita* Bed. N. Afr. 289, ex parte. — Mediterr.). — Da noi nella zona litorale. — Friuli: Monfalcone (sec. Holdh. 1912, 491, nota). — Istria: Salvore 9.910 (Cori 1); Pola (Web, det. Holdh.); Brioni 4.05 (Pa); Veruda 4.910, vagliando il terriccio (Cori 2).

460. *M. minutulus* Goeze (Holdh. in Apfb. 329 e Holdh. 1912, 503; *minutulus* Ganglb. et Reitt., ex parte; *Lebia glabrata* Duft. Fn. Austr. II, 248, tipo: Trieste; *Blechnus glabratus* Dej., Schaum, Desbr., ex parte. — Europa media, Siberia). — Carso di Gorizia: Lago di Doberdo 4.05 (M 1). — Trieste (Holdh. 1912, 505); sull'altipiano a Fernetich, sotto le corteccie di tronchi di pino 3.22 (M 1) e M. Castellaro 5.06 (M 1). — Istria: Clanez 11.911 (M 1); Salvore, sotto un sasso presso l'abbeyveratoio in vicinanza del faro, 4.22 (M, plur); Brioni 4.05 (Pa); Abbazia (Holdh. 1912, 505).

— *M. negrita* Woll. (Holdh. 1912, 506; *glabratus* Dej., Schaum et Desbr., ex parte; *minutulus* Ganglb. et Reitt., ex parte; *minutulus Apfelbecki* Holdh. in Apfb. 330). — Quantunque non abbia veduto alcun es. della V. G., credo che questa specie non mancherà almeno in Istria, essendo molto diffusa nella reg. mediterranea. Io la posseggo dalla Dalmazia (Salona, Metcovich).

461. *M. fulvibasis* Reitt. (Deutsche ent. Zeitschr. 1900, 377, tipi: Veglia ecc., Holdh. 1912, 512 e Bed. N. Afr. 288; *plagiatus fulvibasis* Holdh. in Apfb. 335. — Eur. mer., Asia min., Siria, Caucasia, Turkestan, Persia sett.). — Da noi nella reg. litorale e insulare. — Friuli: Grado 9.07 e Monfalcone 10.08 (M 2); Gorizia (Holdh. 1912, 514). — Trieste: S. Luigi e Cacciatore, 3 e 4.08 (Ciana). — Isole: Brioni, in IV, V e VIII, div.; Lussin (*Schatzm.* Is. Adr. 143); Veglia (loc. class., Reitt.).

462. *M. corticalis* Dufour (Holdh. 1912, 517 e Bed. N. Afr. 289; *plagiatus* auct. pars, nec Duft. — Mediterr., Asia centr.). — Da noi la razza ad elitre unicolori, nere:

a) *corticalis escorialensis* Bris. (Holdh. 1912, 518 e Bed. N. Afr. 288 e 290; *Bl. escorialensis* Bris., Reitt. Deutsche ent. Zeitschr. 1900, 375; *plagiatus escorialensis* Holdh. in Apfb. 335. — Italia, Balcania, Lago di Neusiedl pr. Vienna). — Istria: Noghera nel Vallone di Muggia,