

80. Statura più allungata, pronoto meno ampio, gli angoli post. retti o leggermente smussati; colorito del corpo nero, le antenne spesso bruniccie o nerastre coll' articolo basale più chiaro; 7-8.5 mm.

272. *anxius*.

- Statura più larga, ovale, pronoto ampio, colla massima larghezza nella metà post. o alla base, la quale è sempre smarginata ad arco, gli angoli post. leggermente acuti; corpo piceo, gli orli del pronoto e le elitre spesso ferruginee, le antenne gialle; 7.5-8.5 mm. — Eur. sett. e media, spec. sulle dune litorali [servus Duft.]

81. Corpo nero o piceo, pronoto trasversale e liscio. — 82.

- Corpo ferrugineo, pronoto cordiforme e punteggiato alla base. (Le tibie ant. come descritte al n. 32, capovero secondo). — 85.

82. Il ventre glabro, i femori con pochi punti setigeri; il capo normale, non ingrossato. — 83.

- Il ventre ed i femori con numerosi punti piliferi; anche il prosterno anteriormente con lunghe setole erette. Il capo ingrossato, il mento privo di denti mediano. — 84.

83. Statura maggiore, gli omeri distintamente angolosi, le antenne meno brevi ²⁹⁾. I lati del pronoto quasi rettilinei e leggermente ristretti verso la base, gli angoli post. quasi retti, leggermente smussati; le elitre della ♀ opache; le antenne, la base delle tibie ed i tarsi rossicci; 8-9 mm. — Dalmazia mer., Balcania.

[albanicus Reitt.]

- Statura minore, l'angolo omerale ottuso o arrotondato, le antenne molto brevi (*Actephilus* Steph.). Corpo piccolo, breve, i lati e gli angoli post. del pronoto arrotondati; le antenne gialle, le tibie leggermente nerastre all'apice oppure del tutto gialle 5-6.5 mm.

174. *picipennis*.

Subg. *Microderes* Fald.

84. Un' unica specie medio-europea: Breve, subcilindrica, un po' somigliante ad un piccolissimo *Acinopus*. Gli angoli post. del pronoto arrotondati; i tarsi post. più brevi che nei soliti *Harpalus*. Antenne gialle, le tibie e i tarsi rosso-bruni; 8-10 mm. — Specie pontica, che si estende a occidente fino Vienna. [scaritides Strm.]

Subg. *Acardystus* (Reitt.) Schaubberger.

85. Pronoto cordiforme, più o meno punteggiato alla base; elitre senza punto setigero nella 3. interstria, l'apice suturale spiniforme nella ♀; le tibie anter. con lobo apicale protratto (*Acardystus* s. str.). Corpo totalmente giallo-rossiccio, allungato, poco convesso; 11-13 mm.

275. *rufus*.

²⁹⁾ Qui andrebbero inseriti anche i rarissimi es. anomali dell'*H. anxius* e *modestus* senza puntino impresso nella 3.a interstria. L'*anxius* si distingue dall'*albanicus* per statura più allungata, più piatta, le elitre con smarginatura apicale più evidente, le antenne spesso infossate verso l'apice; le tibie ant. con 3 spine apicali esterne. Il *modestus* per statura alquanto minore e gli angoli post. del pronoto più arrotondati; le tibie ant. con 5-6 spine apicali esterne.